



果樹・果菜害虫に長く  
幅広い効果。

# バリアード®

顆粒水和剤

バリアードが守る。実る。

ネオニコチノイド系  
殺虫剤



アブラムシ類



モモシクイガ



チャノホソガ



タバココナジラミ

- 鱗翅目害虫、吸汁害虫に高い効果を発揮！
- 作物に対して安全で環境負荷も少ない！
- 使いやすい「顆粒水和」だから使用者も安心！





- 広範囲の害虫に高い防除効果があります。
- ハチ類に対して影響が少ないので、果菜類(いちご・トマト・ミニトマト)などにも使いやすい薬剤です。
- 優れた浸透移行性、残効性を持っているので、作物全体を害虫の被害から守ります。
- 粉立ちせず、非常に溶けやすい顆粒タイプで使いやすい薬剤です。
- 人畜・魚介類に対しての安全性が高く、環境にもやさしい薬剤です。

## 適用害虫および使用方法

(2014年12月現在の登録内容)

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	10アール 当り 使用液量 (ℓ)	使用 時期*	使用 回数*	使用方法	作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	10アール 当り 使用液量 (ℓ)	使用 時期*	使用 回数*	使用方法					
りんご	カメムシ類 リンゴワタムシ	2,000	200~700	前日	3回	散布	ぶどう	チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ類	2,000~4,000	200~700	21日	2回						
	アブラムシ類	4,000																
	シンクイムシ類	2,000~4,000																
	キンモンホソガ ギンモンハモグリガ コナカイガラムシ類	4,000																
なし	アブラムシ類 シンクイムシ類	2,000~4,000									メロン	ウリノメイガ		2,000	200~4,000	前日	3回	散布
	クワコナカイガラムシ	4,000																
	カメムシ類	2,000																
	アブラムシ類 シンクイムシ類 モモハモグリガ	2,000~4,000																
ネクタリン	アブラムシ類 シンクイムシ類 モモハモグリガ	2,000~4,000					3日			いちご	アブラムシ類	2,000~4,000		100~300	前日	3回		
小粒核果類 (うめ・すももを除く)	アブラムシ類	2,000~4,000					前日	2回			ズッキーニ とうがらし類	アブラムシ類						
すもも	シンクイムシ類	4,000																
	モモノゴダラノメイガ																	
	アブラムシ類	2,000~4,000																
うめ	アカマダラケシキスイ シンクイムシ類	4,000																
	オウトウショウジョウバエ	2,000																
おうとう	ウメシロカイガラムシ	4,000																
	茶	チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ チャノホソガ コミカンアブラムシ	2,000~4,000	7日	1回					マダラカサハラハムシ	2,000	200~400						

\*印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫(摘採)前の日数と、本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

## 注意事項

- ネクタリン、すもも及びあんずでは品種により葉に葉害(軽い穴あき症状)を生ずることがありますので注意して下さい。
- 蚕に対して長期間毒性がありますので、桑に付着する恐れのある場所では使用を避けて下さい。
- 医薬用外劇物なので、取り扱いに十分注意して下さい。
- 散布時は、保護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用して下さい。
- 薬剤が眼に入らないよう注意して下さい。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けて下さい。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切して下さい。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。