




ダニより つよい ダニエモン

ダニエモン[®] フロアブル



- 全く新しい系統の殺ダニ剤で、作用性も異なるので、かんぎつの抵抗性ハダニにも高い効果があります。
- ミカンハダニ、ミカンサビダニの全てのステージに対して安定した効果を示し、長期間密度を抑制します。
- 耐雨性に優れます。
- 天敵、有用昆虫に影響が少なく、環境に優しく使いやすい薬剤です。
- 人畜、水産動物、作物に対して高い安全性。

®はバイエルグループの登録商標

ダニに
エエもんあります。



ミカンハダニ

ミカンサビダニ

チャノホコリダニ

新
ボトル

開けやすく、注ぎやすくなりました。



■新ボトル開封方法



キャップ上部の突起を銀色のアルミシールに刺します。

そのままキャップを押し回してください。


シールを開封し、使用してください。



Bayer CropScience

■ 上手な使い方

ミカンハダニ、ミカンサビダニの発生とダニエモンフロアブルの散布適期



ミカンハダニ、ミカンサビダニの発生消長は地域によって異なる場合があります。また、散布適期は、一般的な防除暦に合わせてあります。ご使用の際は各地区の防除暦に従って下さい。

ボルドー液との近接散布は、前後2週間あけて使用して下さい。


■ 適用害虫および使用方法

(2012年10月現在の登録)


作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	10アール当り使用液量(ℓ)	使用時期*	総使用回数*	使用方法
かんきつ	ミカンハダニ ミカンサビダニ	4,000 ~ 6,000	200 ~ 700	7日	1回	散布
	サビダニ類 (ミカンサビダニを除く) チャノホコリダニ ミカンキジラミ	4,000				
びわ	ビワサビダニ			21日		
さんしょう(果実)	ミカンハダニ					

*印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と、本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

■ 試験成績



品 種：宮内伊予柑18年生 害虫発生状況：中発生 処理月日：6月15日
散布量：約12ℓ/樹
調 査：散布前、散布3、10、19、31、41日後に雌成虫数を調査



品 種：普通温州23年生 害虫発生状況：極少-多発生 処理月日：6月30日に十分量を散布
調 査：10月23日に各区100果について被害度別被害率を求めた。

■ 他剤との混用事例(かんきつ)

ダニエモンフロアブルは下記薬剤との混用で薬害事例は認められませんでした。

殺虫剤混用		殺菌剤混用		3種混用	
アグロスリン水和剤	ダズバン乳剤40	Zボルドー	デランフロアブル		ジマンダイセン水和剤 アドマイヤーフロアブル
アドマイヤーフロアブル	テルスター水和剤	アリエッティ水和剤	トップジンM水和剤		ジマンダイセン水和剤 アドマイヤー顆粒水和剤
アドマイヤー顆粒水和剤	トクチオン乳剤	エムダイファー水和剤	ナリアWDG		
アブロード水和剤	ノーモルト乳剤	オキシラン水和剤	パスワード顆粒水和剤	ジマンダイセン水和剤 スプラサイド乳剤	
エルサン乳剤	ベストガード水溶剤	カスミンボルドー	フロンサイドSC		
オリオン水和剤40	マブリック水和剤20	ゲッター水和剤	ペフラン液剤25	ジマンダイセン水和剤 モスピラン水溶剤	
カスケード乳剤	マブリックEW	コサイドDF	ベンコゼブ水和剤		
カルホス乳剤	モスピラン水溶剤	コサイドボルドー	ベンレート水和剤		
コテツフロアブル	ラービフロアブル	ジマンダイセン水和剤	マネーシ水和剤		
ジメトエート乳剤	ロディー乳剤	ストロビドライフフロアブル	ランマンフロアブル		
スタークル顆粒水溶剤	MR.ジョーカー水和剤	スミブレンド水和剤	リドミルMZ水和剤		
スプラサイド乳剤40		スミレックス水和剤	ロプラール水和剤		

■ 注意事項

- 本剤は貯蔵中に分離することがありますので、使用に際しては容器をよく振って下さい。
- ミカンキジラミの防除に使用する場合は、成虫には効果が劣るので、幼虫防除を対象とした散布を行って下さい。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。