

## 適用病害虫・雑草と使用方法

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メチルイソチオシアネートを含む農薬の総使用回数	D-Dを含む農薬の総使用回数
しょうが	センチュウ類	20～30ℓ/10a	は種または植付の21日前まで	1回	圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12～15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7～14日後にガス抜き作業を行う。	1回	1回
	根茎腐敗病 立枯病 一年生雑草	30～40ℓ/10a					
ごぼう	センチュウ類	20～30ℓ/10a	は種の21日前まで				
	萎凋病 一年生雑草	30～40ℓ/10a					
ねぎ わけぎ あさつき	センチュウ類	20～30ℓ/10a	は種または植付の14日前まで				
	根腐萎凋病	40ℓ/10a					
	萎凋病 黒腐菌核病 白絹病 一年生雑草	30～40ℓ/10a					
たまねぎ	センチュウ類	20～30ℓ/10a					
	黒腐菌核病	30ℓ/10a					
	乾腐病 一年生雑草	30～40ℓ/10a					
ふき	センチュウ類	20～30ℓ/10a	植付の30日前まで				
	半身萎凋病 一年生雑草	30ℓ/10a					

## 適用病害虫・雑草と使用方法

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メチルイソチオシアネートを 含む農薬の総使用回数	D-Dを含む 農薬の総使用回数
トマト ミニトマト	センチュウ類	20～30ℓ/10a	は種または 植付の21 日前まで	1回	圃場を耕起・整地した 後、所定量を深さ約12 ～15cmに注入し、直 ちに覆土・鎮圧する。 薬剤処理7～14日後に ガス抜き作業を行う。	1回	1回
	半身萎凋病	30ℓ/10a					
	苗立枯病(リゾクトニア菌)	40ℓ/10a					
	萎凋病 根腐萎凋病 一年生雑草	30～40ℓ/10a					
だいこん	センチュウ類	20～30ℓ/10a	は種または 植付の14 日前まで				
	根こぶ病 バーティシリウム黒点病	30ℓ/10a					
	萎黄病 一年生雑草	30～40ℓ/10a					
	センチュウ類	20～30ℓ/10a	は種または 植付の21 日前まで (砂質土)				
	根こぶ病 バーティシリウム黒点病	30ℓ/10a					
	萎黄病 一年生雑草	30～40ℓ/10a					
すいか	センチュウ類	20～30ℓ/10a	は種または 植付の21 日前まで				
	つる割病 一年生雑草	30～40ℓ/10a					

## 適用病害虫・雑草と使用方法

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メチルイソチオシアネートを含む農薬の総使用回数	D-Dを含む農薬の総使用回数		
メロン	センチュウ類	20～30ℓ/10a	は種または植付の30日前まで	1回	圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12～15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7～14日後にガス抜き作業を行う。	1回	1回		
	つる割病 一年生雑草	30～40ℓ/10a							
ほうれんそう	センチュウ類	20～30ℓ/10a	は種の30日前まで		圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12～15cmに注入し、直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。薬剤処理7～14日後にガス抜き作業を行う。			1回	1回
	バーティシリウム萎凋病	30ℓ/10a							
	萎凋病 一年生雑草	30～40ℓ/10a							
	苗立枯病(ピシウム菌)	40ℓ/10a							
かぶ	センチュウ類	20～30ℓ/10a	は種の21日前まで		圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12～15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7～14日後にガス抜き作業を行う。			1回	1回
	根こぶ病 バーティシリウム黒点病	30ℓ/10a							
	萎黄病 一年生雑草	30～40ℓ/10a							
らっきょう	センチュウ類	20～30ℓ/10a	は種または植付の21日前まで	圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12～15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7～14日後にガス抜き作業を行う。	1回	1回			
	黒腐菌核病 根腐病 乾腐病 一年生雑草	30～40ℓ/10a							

## 適用病害虫・雑草と使用方法

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メチルイソチオシアネートを 含む農薬の総使用回数	D-Dを含む 農薬の総使用回数
にんにく	センチュウ類	20～30ℓ/10a	は種または 植付の30 日前まで	1回	圃場を耕起・整地した 後、所定量を深さ約12 ～15cmに注入し、直 ちに覆土・鎮圧する。 薬剤処理7～14日後に ガス抜き作業を行う。	1回	1回
	乾腐病 紅色根腐病 黒腐菌核病 一年生雑草	30ℓ/10a					
キャベツ	センチュウ類	20～30ℓ/10a	は種または 植付の21 日前まで				
	バーティシリウム萎凋病	40ℓ/10a					
	萎黄病 根こぶ病 菌核病 一年生雑草	30～40ℓ/10a					
はくさい	センチュウ類	20～30ℓ/10a	は種または 植付の21 日前まで				
	萎黄病 根こぶ病	30～40ℓ/10a					
	黄化病	30ℓ/10a					
	一年生雑草	30～40ℓ/10a					
レタス 非結球レタス	センチュウ類	20～30ℓ/10a	は種または 植付の21 日前まで				
	バーティシリウム萎凋病	30ℓ/10a					
	根腐病 一年生雑草	30～40ℓ/10a					

## 適用病害虫・雑草と使用方法

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メチルイソチオシアネートを 含む農薬の総使用回数	D-Dを含む 農薬の総使用回数
いちご	センチュウ類	20～30ℓ/10a	は種または 植付の21 日前まで	1回	圃場を耕起・整地した 後、所定量を深さ約12 ～15cmに注入し、直 ちに覆土・鎮圧する。 薬剤処理7～14日後に ガス抜き作業を行う。	1回	1回
	疫病 萎凋病	30ℓ/10a					
	萎黄病 炭疽病 一年生雑草	30～40ℓ/10a					
きゅうり	センチュウ類	20～30ℓ/10a					
	つる割病 一年生雑草	30～40ℓ/10a					
にんじん	センチュウ類	20～30ℓ/10a					
	萎凋病 しみ腐病 黒しみ病 一年生雑草	30～40ℓ/10a					
なす	センチュウ類	20～30ℓ/10a					
	萎凋病 半枯病 半身萎凋病 一年生雑草	30ℓ/10a					

## 適用病害虫・雑草と使用方法

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メチルイソチオシアネートを含む農薬の総使用回数	D-Dを含む農薬の総使用回数
こんにゃく	センチュウ類	20～30ℓ/10a	は種または植付の21日前まで	1回	圃場を耕起・整地した後、所定量を深さ約12～15cmに注入し、直ちに覆土・鎮圧する。薬剤処理7～14日後にガス抜き作業を行う。	1回	1回
	乾腐病 根腐病 白絹病 一年生雑草	30～40ℓ/10a					
やまのいも	センチュウ類	20～30ℓ/10a					
	褐色腐敗病 一年生雑草	30～40ℓ/10a					
茶	センチュウ類	20～30ℓ/10a					
	白紋羽病	30～40ℓ/10a					
	苗根腐病	50ℓ/10a					
	一年生雑草	30～40ℓ/10a					
たばこ	センチュウ類 黒根病	20～30ℓ/10a					
	立枯病 一年生雑草	30～40ℓ/10a					
きく	センチュウ類 (ハガレセンチュウを除く)	20～30ℓ/10a					
	半身萎凋病 萎凋病 一年生雑草	30～40ℓ/10a					

## 適用病害虫・雑草と使用方法

作物名	適用病害虫・雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メチルイソチオシアネートを 含む農薬の総使用回数	D-Dを含む 農薬の総使用回数
カーネーション	センチュウ類	20～30ℓ/10a	は種または 植付の21 日前まで	1回	圃場を耕起・整地した 後、所定量を深さ約12 ～15cmに注入し、直 ちに覆土・鎮圧する。 薬剤処理7～14日後に ガス抜き作業を行う。	1回	1回
	萎凋病 萎凋細菌病 一年生雑草	30～40ℓ/10a					
花き類・観葉植物 (カーネーション、 きくを除く)	センチュウ類	20～30ℓ/10a					
	半身萎凋病	30ℓ/10a					
	萎凋病(フザリウム菌) 萎黄病(フザリウム菌) 球根腐敗病(フザリウム菌) 苗立枯病(フザリウム菌) 尻腐病(フザリウム菌) 腐敗病 乾腐病 萎縮病 一年生雑草	30～40ℓ/10a					
つつじ類	イシユクセンチュウ 一年生雑草	30ℓ/10a	植付の21 日前まで				