

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イプロジオンを含む農薬の総使用回数
なし	黒斑病	1000～1500倍	200～700ℓ /10a	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内
もも ネクタリン	灰星病			1000倍	収穫前日まで		3回以内
	ホモプンス腐敗病						
おうとう	灰星病	1000～1500倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内
	黒かび病	1000倍					
すもも	灰星病	1000～1500倍		収穫3日前まで	2回以内		2回以内
あんず							
びわ	灰色かび病	1000～1500倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内
うめ				環紋葉枯病			
食用桑(果実)	菌核病	1000倍		収穫14日前まで	4回以内		4回以内
キウイフルーツ	果実軟腐病	1000～1500倍		収穫前日まで			
	灰色かび病			開花期～落花期			
	貯蔵病害(灰色かび病)	1500～2000倍	収穫前日まで				
ぶどう	灰色かび病 白腐病	1000～1500倍	開花期～幼果期 ただし、 収穫60日前まで	3回以内	3回以内		
	黒とう病	1000倍					
マンゴー	灰色かび病		1000倍	収穫7日前まで			

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イプロジオンを含む農薬の総使用回数
はとむぎ	葉枯病	1000倍	60～150ℓ/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内
		8倍	3.2ℓ/10a			無人航空機による散布	
いちご	灰色かび病 黒斑病 菌核病	1500倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	5回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は4回以内)
ピーマン	灰色かび病	1000～1500倍					
	菌核病	1000倍					
なす	灰色かび病 黒枯病	1000～1500倍					
	菌核病 すすかび病 褐色斑点病	1000倍					
きゅうり	灰色かび病	1000～1500倍					
	菌核病 つる枯病	1000倍					
すいか メロン							
ズッキーニ	灰色かび病	1000～1500倍					

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イプロジオンを含む農薬の総使用回数
キャベツ	菌核病 株腐病	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	5回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は4回以内)
薬用にんじん	灰色かび病 斑点病	1000～1500倍		収穫14日前まで			
にんじん	斑点病						
		黒葉枯病	種子重量の0.5%	—	は種前	種子粉衣	
漬物用メロン	菌核病 つる枯病	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫14日前まで	1回	散布	2回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は1回以内)
オクラ	黒斑病 灰色かび病	2000倍		収穫前日まで	3回以内		4回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は3回以内)
トマト ミニトマト	灰色かび病	1000～1500倍					
		輪紋病 斑点病		1000倍	収穫3日前まで		
ごぼう	菌核病	収穫7日前まで					
あしたば	葉枯病						

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イプロジオンを含む農薬の総使用回数	
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 黒斑病	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は3回以内)	
くきちしゃ	灰色かび病	1000～1500倍						
	菌核病 すそ枯病	1000倍						
みずな	菌核病			1000倍	収穫45日前まで			2回以内
非結球レタス	灰色かび病	1000～1500倍		1000倍	収穫21日前まで		3回以内	4回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は3回以内)
	菌核病 すそ枯病							
レタス	灰色かび病	1000～1500倍		1000倍	収穫14日前まで		3回以内	
	菌核病 すそ枯病							
しそ バジル	菌核病	2000倍						
非結球はくさい	白斑病	1000倍					2回以内	3回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は2回以内)

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イプロジオンを含む農薬の総使用回数
はくさい	菌核病	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	4回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は3回以内)
	白斑病 黒斑病	1000～1500倍					
ねぎ	ボトリチス葉枯症 黒斑病		500倍			0.5～1ℓ/m ²	
	小菌核腐敗病						
	白絹病	500～1000倍	1ℓ/m ²				
あさつき	ボトリチス葉枯症 黒斑病 小菌核腐敗病	1000～1500倍	100～300ℓ /10a			収穫30日前まで	
わけぎ							
らっきょう	灰色かび病	1000倍		収穫前日まで			
ばれいしょ	菌核病 夏疫病						
		黒あざ病	125倍	3ℓ/種いも 100kg	植付前	1回	種いも散布
さやえんどう	灰色かび病	1500倍	100～300ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は3回以内)

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イプロジオンを含む農薬の総使用回数
えだまめ	灰色かび病 菌核病	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	4回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は3回以内)
未成熟そらまめ	赤色斑点病			収穫前日まで			
実えんどう	灰色かび病			収穫21日前まで			
だいず あずき	灰色かび病 菌核病						
いんげんまめ	灰色かび病	1000～1500倍					
	菌核病	500～1000倍					
らっかせい	灰色かび病	1000～1500倍		収穫7日前まで	3回以内		
てんさい	葉腐病	500～1000倍					
食用ゆり	葉枯病	1000倍		収穫前日まで	2回以内		3回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は2回以内)
ししとう	灰色かび病	2000倍		収穫前日まで			
とうがらし類 (ししとうを除く)				収穫3日前まで			
葉たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 黒斑病	1000倍		収穫14日前まで			
	未成熟ささげ		灰色かび病	1500倍		収穫前日まで	

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イプロジオンを含む農薬の総使用回数
葉ごぼう	菌核病	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	3回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は2回以内)
のざわな				収穫35日前まで			
みつば (軟化栽培)				根株養成期 地上部切り取り前 ただし、収穫35日前まで			
			2ℓ/m ²	伏込時 ただし、 収穫30日前まで	1回	土壌灌注	4回以内 (種子粉衣は1回以内、 散布は2回以内、土壌灌 注は1回以内)
畑わさび	墨入病	500倍	—	定植時	3回以内	定植時に20 時間苗浸漬 し、更に定 植後に灌注 する。	5回以内 (種子粉衣は1回以内、 苗浸漬は1回以内、定植 後は3回以内)
		3ℓ/m ²	定植後 ただし、 収穫30日前まで				
うど	黒斑病	1000倍	100～300ℓ /10a	根株養成期 ただし、 収穫50日前まで	3回以内	散布	4回以内 (散布は3回以内、土壌 灌注は1回以内)
	菌核病		6ℓ/m ²	伏せ込み時 ただし、 収穫21日前まで	1回	土壌灌注	
アスパラガス	茎枯病 斑点病 褐斑病	2000倍	100～300ℓ /10a	収穫前日まで	5回以内	散布	6回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は5回以内)
茶	灰色かび病	1000～1500倍	200～400ℓ /10a	摘採21日前まで	2回以内		2回以内
スターチス			100～300ℓ /10a	—	8回以内		8回以内 (種子粉衣は1回以内)

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イプロジオンを含む農薬の総使用回数
りんどう	苗腐敗症 (アルタナリア菌)	250～500倍	—	は種前	1回	48時間種子浸漬	2回以内 (種子浸漬は1回以内)
		1000倍	100～300ℓ /10a	本葉展開直後～定植前	2回以内	散布	
たばこ	菌核病	1500～2000倍	200ml/株	大土寄時	1回	株元灌注	1回
芝	葉腐病(ブラウンパッチ) ヘルミントスポリウム葉枯病	1000～1500倍	1ℓ/m ²	発病初期	8回以内	散布	8回以内
日本芝	葉腐病(ラージパッチ)						
西洋芝 (ベントグラス)	ダラースポット病						
野菜類 花き類	アルタナリア菌による病害	種子重量の0.5%	—	は種前	1回	種子処理機による種子粉衣	1回

適用病害と使用方法

作物名	適用場所	適用病害名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イプロジオンを含む農薬の総使用回数
きゅうり	温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所	灰色かび病	200g/10a	5ℓ/10a	収穫前日まで	4回以内	常温煙霧	5回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は4回以内)
トマト ミニトマト						3回以内		4回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は3回以内)
ぶどう				6ℓ/10a	開花期～幼果期、 ただし、収穫60日 前まで	3回以内		3回以内