

適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	メトリブジンを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量					
ばれいしょ	一年生雑草	100g/10a	100ℓ/10a	植付直後～萌芽期まで	1回	雑草茎葉散布 または 全面土壌散布	北海道、東北	1回
アスパラガス		100～150g/10a		萌芽前～萌芽始期				
トマト(露地栽培)		60～100g/10a		収穫打切り後 (雑草発生前～4、5葉期)				
さとうきび (春植または夏植)	一年生雑草 ムラサキカタバミ	300g/10a		植付直後～ 植付45日後まで (雑草2葉期まで)		全面土壌散布	全域	
		100～200g/10a		植付直後～ 収穫30日前まで (雑草2葉期まで)				
さとうきび (株出)		300g/10a	萌芽45日後まで (雑草2葉期まで)	全面土壌散布				
		100～200g/10a	収穫30日前まで (雑草2葉期まで)	雑草茎葉散布				

## 適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	メトリブジンを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量					
飼料用さとうきび (春植または夏植)	一年生雑草 ムラサキカタバミ	300g/10a	100ℓ /10a	植付直後～ 植付45日後まで (雑草2葉期まで)	1回	全面土壌散布	全域	1回
		100～200g /10a		植付直後～ 収穫45日前まで (雑草2葉期まで)		雑草茎葉散布		
飼料用さとうきび (株出)		300g/10a		萌芽45日後まで (雑草2葉期まで)		全面土壌散布		
		100～200g /10a		収穫45日前まで (雑草2葉期まで)		雑草茎葉散布		

作物名	適用場所	適用雑草名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メトリブジンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量				
樹木等	公園、庭園、堤とう、 駐車場、道路、運動 場、宅地等	一年生雑草	300g/10a	100～300ℓ /10a	雑草発生前～ 4、5葉期	2回以内	植栽地を除く樹木等の 周辺地に雑草茎葉散 布および全面土壌散布	2回以内