

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マシン油を含む農薬の総使用回数
かんきつ	ミカンハダニ	400倍	200~700ℓ /10a	3月~6月中旬	—	連続散布	—
		100~150倍		4月~5月			
		200倍		着色後又は秋期(10月~11月)			
	カイガラムシ類	150~200倍		夏期(6月~7月中旬)			
		ミカンハダニ カイガラムシ類		60~80倍			
りんご	カイガラムシ類	50倍		発芽前			
	ハダニ類	50~100倍		芽出し直前直後			
		100倍		展葉期(発芽後2週間まで)			
		200倍		展葉期(発芽後3週間まで)			
なし	ニセナシサビダニ	50~100倍		発芽前			
	ハダニ類 カイガラムシ類	50~200倍					
	ハダニ類	150~200倍					
びわ びわ(葉)	ビワサビダニ	100倍	10月~3月				
			8月~3月				
	カイガラムシ類	50倍	果実収穫後~開花前				

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マシン油を含む農薬の総使用回数
もも	モモアカアブラムシ	50倍	200~700ℓ /10a	発芽前	—	散布	—
	カイガラムシ類	25~50倍					
ネクタリン	モモアカアブラムシ カイガラムシ類	50倍					
おうとう 小粒核果類 かき	カイガラムシ類						
マンゴー	ハダニ類	100倍	収穫後~萌芽前				
きゅうり	うどんこ病 ハダニ類	100~200倍	100~300ℓ /10a	—	—	—	
いちご		200倍					
茶	カンザワハダニ	50~150倍	200~400ℓ /10a	発芽前または摘採直後	—	—	—
	チャトゲコナジラミ	50~100倍		10月~3月			
		100~150倍		5月~9月			
	クワシロカイガラムシ	50~100倍	1000ℓ/10a	10月~3月			

作物名	使用方法	適用農薬名
なし	本剤でベノミル剤を20倍に希釈し、塗布する。	ベノミル剤