

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ホセチルを含む農薬の総使用回数
ぶどう	べと病	800倍	200～700ℓ /10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内
かんきつ	苗疫病 褐色腐敗病	400～800倍		収穫前日まで			
なし	黒斑病 輪紋病	800倍		収穫14日前まで			
	疫病	800～1000倍					
キウイフルーツ	果実軟腐病	600倍		幼果期まで ただし 収穫120日前まで	2回以内		
パッションフルーツ	疫病	800倍	収穫7日前まで	3回以内	3回以内		
パイナップル	心腐病	200倍	—	植付時	1回	苗浸漬	2回以内 (苗浸漬は1回以内)
	根腐萎凋病	400～800倍	100ml/株	開花期まで	2回以内	土壌灌注	
さるなし	果実軟腐症	600倍	200～700ℓ /10a	収穫60日前まで	1回	散布	1回
りんご	すす点病 すす斑病 斑点落葉病	800～1000倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内
	褐斑病	1000倍					
にんじん	黒葉枯病	800倍	100～300ℓ /10a	収穫7日前まで			

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ホセチルを含む農薬の総使用回数	
かぼちゃ	疫病 べと病	400～800倍	100～300ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
きゅうり	べと病							
メロン								
ねぎ わけぎ	疫病 べと病	800倍		収穫3日前まで				
ほうれんそう	べと病 白斑病	1500倍		収穫前日まで	2回以内			2回以内
なばな	白さび病	2000倍						
みつば	べと病	1000倍		収穫14日前まで ただし伏せ込み栽培は伏せ込み前まで				
畑わさび(根茎)		600倍		収穫21日前まで	3回以内			3回以内
わさび(根茎)				畑育苗期				
サラダ菜	褐斑病	1500倍		収穫3日前まで	2回以内			2回以内
エンサイ	白さび病	1000倍		収穫7日前まで				
ホップ	べと病	800倍		200～700ℓ /10a	収穫14日前まで			3回以内
たばこ	疫病	400～800倍	200ml/株	大土寄時	2回以内	株元灌注	2回以内	
	舞病		100ml/株	移植時				