

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シフルトリンを含む農薬の総使用回数			
キャベツ	アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ タマナギンウワバ	1000~2000倍	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内			
はくさい	アオムシ コナガ	2000倍		100~300ℓ/10a	収穫3日前まで		4回以内	散布	4回以内	
だいこん	アブラムシ類 ヨトウムシ									
にんじん	アブラムシ類 ヨトウムシ				収穫21日前まで		3回以内			3回以内
ごぼう	アブラムシ類				収穫7日前まで		4回以内			4回以内
たまねぎ	ネギアザミウマ				収穫前日まで					
レタス	ヨトウムシ アブラムシ類	収穫7日前まで		2回以内	2回以内					
えだまめ	マメシンクイガ	1000~2000倍		100~300ℓ/10a	収穫14日前まで		3回以内	散布	3回以内	
	カメムシ類	1000倍								
豆類 (種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめを除く)	アブラムシ類	2000倍		100~300ℓ/10a	収穫7日前まで		3回以内	散布	3回以内	

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シフルトリンを含む農薬の総使用回数
だいず	カメムシ類	1000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	マメシンクイガ	1000～2000倍					
	アブラムシ類	2000倍					
あずき	アブラムシ類 アズキノメイガ						
	いんげんまめ						
小麦	アブラムシ類	60～150ℓ/10a					
ばれいしょ	アブラムシ類	2000～3000倍	100～300ℓ/10a	収穫14日前まで	4回以内	4回以内	
かんしょ	イモコガ ナカジロシタバ	1000～2000倍					
てんさい	ヨトウムシ	2000～3000倍	25ℓ/10a	収穫14日前まで	4回以内	4回以内	
		500倍					
	カメノコハムシ	2000倍	100～300ℓ/10a				
		500倍					25ℓ/10a
茶	チャノコカクモンハマキ チャノキイロアザミウマ チャハマキ チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ	1000～2000倍	200～400ℓ/10a	摘採7日前まで	1回	1回	