

## 適用害虫と使用方法

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数
稲	—	ツマグロヨコバイ ウンカ類	3kg/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内 (は種時(直播)または移植時までの処理は1回以内、 本田での散布は2回以内)
かんきつ (苗木)		ミカンハモグリガ	20g/樹 (ただし、6kg/10aまで)	育苗期	1回	株元散布	1回
えだまめ		アブラムシ類	セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット 1冊(30×60cm、使用土 壌約1.5~4ℓ)当り50g	は種時		本剤の所定量をセル成 型育苗トレイまたはペ ーパーポットの培土に 均一に混和する。	3回以内 (定植時およびは種時の 土壌混和は合計1回以内、 散布は2回以内)
						播溝土壌混和	
豆類(未成熟、 ただし、えだまめ、 さやいんげん、 未成熟そらまめ を除く)			2g/植穴 (ただし、6kg/10aまで)	定植時		植穴土壌混和	
			3kg/10a	は種時		播溝土壌混和	
			1~2g/株 (ただし、6kg/10aまで)	定植時または は種時		植穴土壌混和	
さやいんげん			3kg/10a	は種時		播溝土壌混和	
未成熟そらまめ			2g/植穴 (ただし、6kg/10aまで)	定植時		植穴土壌混和	

## 適用害虫と使用方法

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数	
きゅうり	—	アブラムシ類	1g/株	育苗期後半	1回	株元散布	4回以内 (育苗期の株元散布および定植時の土壌混和は合計1回以内、散布および常温煙霧は合計3回以内)	
		アザミウマ類	1~2g/株	定植時		植穴または株元土壌混和		
		コナジラミ類	2g/株			植穴土壌混和		
すいか		アブラムシ類	5g/株(ただし、3kg/10aまで)	定植時		株元土壌混和	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)	
		アブラムシ類	1~5g/株 (ただし、3kg/10aまで)			植穴土壌混和		
		アザミウマ類	1~2g/株 (ただし、3kg/10aまで)					
メロン		アブラムシ類	1g/株	育苗期後半		定植時	株元散布	4回以内 (育苗期の株元散布および定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内)
		アザミウマ類	1~2g/株	定植時			植穴または株元土壌混和	
		コナジラミ類	2g/株				植穴土壌混和	
かぼちゃ	アザミウマ類	2g/株	定植時	植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)			
にがうり	アブラムシ類	1~2g/株	定植時	植穴または株元土壌混和	2回以内 (定植時の土壌混和は1回以内)			
まくわうり	アブラムシ類	1g/株	定植時	植穴土壌混和	1回			

## 適用害虫と使用方法

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数
トマト ミニトマト	—	コナジラミ類	0.5～1g/株	育苗期後半	1回	株元散布	3回以内 (育苗期の株元散布および定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
			1～2g/株	定植時		植穴土壌混和	
アブラムシ類		1g/株	育苗期後半	株元散布			
		1～2g/株	定植時	植穴または株元土壌混和			
ピーマン とうがらし類		アブラムシ類	1g/株	育苗期後半		株元散布	3回以内 (育苗期の株元散布および定植時の土壌混和は合計1回以内、散布および常温煙霧は合計2回以内)
			アザミウマ類	1～2g/株		定植時	
なす		1g/株					
		アブラムシ類	1～2g/株	定植時		植穴または株元土壌混和	
アザミウマ類			4kg/10a			植溝土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
		わげぎ あさつき					アザミウマ類
ねぎ	アザミウマ類		4kg/10a		定植時	植溝土壌混和	
		はくさい キャベツ					アブラムシ類

## 適用害虫と使用方法

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数
ブロッコリー	—	アブラムシ類	0.5g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	4回以内 (育苗期の灌注は1回以内、 定植時の土壌混和は1回以内、 定植後の処理は2回以内)
レタス				育苗期後半		株元散布	3回以内 (定植時までの処理は 1回以内、定植後の処理は 2回以内)
だいこん			は種時	3~6kg/10a		播溝土壌混和	3回以内 (は種時の土壌混和は 1回以内、は種後の処理は 2回以内)
ほうれんそう かぶ				4kg/10a	3回以内 (は種時の土壌混和は 1回以内、散布は2回以内)		
ごぼう			収穫7日前まで			2回以内	株元散布
いちご			0.5g/株	育苗期後半	1回	植穴土壌混和	1回
パセリ		定植時		2回以内 (定植時までの処理は 1回以内、散布は1回以内)			
		アブラムシ類			は種時	株元散布	
アザミウマ類				収穫14日前まで			

## 適用害虫と使用方法

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数
こんにゃく	—	アブラムシ類	3～6kg/10a	培土時 (基根伸長期)	1回	株元土壌混和	3回以内 (培土時の土壌混和は 1回以内、散布は2回以内)
			6kg/10a	生育期 ただし 収穫21日前まで	2回以内	茎葉散布	
さといも さといも(葉柄) ばれいしょ		4kg/10a	植付時	1回	植溝土壌混和	3回以内 (植付時の土壌混和は 1回以内、植付後の処理は 2回以内)	
れんこん		イネネクイハムシ					3kg/10a
		クワイクビレアブラムシ	4kg/10a	収穫14日前 まで	2回以内		散布
かんしょ		コガネムシ類	4～6kg/10a	植付前	1回		作条土壌混和
			6kg/10a			全面土壌混和	
やまのいも		アブラムシ類	4kg/10a	植付時	1回	植溝土壌混和	3回以内 (植付時までの処理は 1回以内、植付後の処理は 2回以内)
	コガネムシ類						
やまのいも (むかご)						1回	

## 適用害虫と使用方法

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数	
にら	—	アザミウマ類	4kg/10a	定植時	1回	植溝土壌混和	2回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、株元散布は1回以内)	
にら(花茎)		ネギアザミウマ		定植時		植溝土壌混和		
				収穫30日前まで		株元散布		
ごま		—		アブラムシ類		2g/株 (ただし、6kg/10aまで)		は種時
	生育期		5回以内		株元散布			
花き類・観葉植物 (きく、ばら、ペチュニア、レザーフアンを除く)	—	アブラムシ類	3kg/10a	—	—	散布	5回以内	
きく		アブラムシ類				株元散布		
ばら		イバラヒゲナガアブラムシ				2g/株 (ただし、6kg/10aまで)		株元土壌混和
		アブラムシ類						株元散布
じゅんさい	じゅんさい田	ユスリカ類	3kg/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	

## 適用害虫と使用方法

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数
ペチュニア	—	アブラムシ類	2g/株 (ただし、6kg/10aまで)	生育期	5回以内	株元散布	5回以内
			1g/株 (ただし、3kg/10aまで)	定植時	1回	植穴土壌混和	
アザミウマ類		アブラムシ類	2g/株 (ただし、6kg/10aまで)	生育期	5回以内	株元土壌混和	
株元散布							
レザーファン		コナジラミ類	1g/株 (ただし、3kg/10aまで)			株元土壌混和	
ポインセチア		コガネムシ類	4kg/10a	植付時または 植替時	2回以内	作条土壌混和	5回以内 (株元灌注は2回以内、 土壌混和は2回以内)
つつじ類		ツツジグンバイ	6kg/10a	発生初期	5回以内	株元散布	
		樹木類 (つつじ類を除く)	コガネムシ類	4kg/10a	植付時	2回以内	作条土壌混和
たばこ		アブラムシ類	3kg/10a(1g/株)	1回		植穴土壌混和	2回以内 (植付時の土壌混和は 1回以内、散布は1回以内)