

適用害虫と使用方法

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数 |
|-----|----------------------------|-------|--------------|--|---------|------|---------------------|
| びわ | アブラムシ類 カメムシ類 | 2000倍 | 200～700ℓ/10a | 収穫7日前まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く) | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| もも | アブラムシ類 カメムシ類 モモハモグリガ | 5000倍 | | 収穫3日前まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く) | | | |
| なし | アブラムシ類 | | | 収穫7日前まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く) | | | |
| あんず | | | | 収穫21日前まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く) | | | |
| ぶどう | アザミウマ類 | | | | | | |

適用害虫と使用方法

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数 |
|--------------|--|------------|--------------|--|---------|------------|---------------------|
| かんきつ | カイガラムシ類 アザミウマ類 ミカンハモグリガ カメムシ類 アブラムシ類 ゴマダラカミキリ成虫 | 2000～5000倍 | 200～700ℓ/10a | 収穫14日前まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く) | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| | ミカンバエ | 2000～4000倍 | | | | | |
| | ミカンキジラミ | 2000倍 | | | | | |
| | アブラムシ類 アザミウマ類 カメムシ類 ゴマダラカミキリ成虫 ミカンハモグリガ | 80倍 | 8～20ℓ/10a | | | 無人航空機による散布 | |
| | | 40倍 | 4～10ℓ/10a | | | | |
| | | 20倍 | 4～5ℓ/10a | | | | |
| キウイフルーツ | カメムシ類 | 2000倍 | 200～700ℓ/10a | 収穫前日まで (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く) | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| いちょう (種子) | イチョウヒゲビロ ウドカミキリ成虫 | | 収穫前日まで | | | | |
| アセロラ | アブラムシ類 | 4000倍 | 100～300ℓ/10a | 収穫7日前まで | | | |
| ピタヤ | | 2000倍 | | | | | |

適用害虫と使用方法

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数 |
|----------------|---------|-------|--------------|----------|---------|----------------|---|
| アマランサス (茎葉) | アブラムシ類 | 5000倍 | 100~300ℓ/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| キノア | カメノコハムシ | 4000倍 | | | | | |
| キャベツ はくさい | アブラムシ類 | 32倍 | 1.6~2ℓ/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機 による散布 | 3回以内 (定植時までの処理は 1回以内、定植後の 処理は2回以内) |
| | | 150倍 | 4~5ℓ/10a | | | | |
| ブロッコリー | | 2000倍 | 100~300ℓ/10a | | | | |
| | | 24倍 | 1.6~2ℓ/10a | | | | |
| | | 80倍 | 4~5ℓ/10a | | | | |
| 畑わさび | | 4000倍 | 100~300ℓ/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| わさび | | | | 畑育苗期 | | | |
| だいこん | | 4000倍 | 100~300ℓ/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 (は種時の土壌混和は 1回以内、は種後の 処理は2回以内) |
| みずな | | | | 収穫3日前まで | | | |
| 非結球メキャベツ | | | | 収穫7日前まで | | | 2回以内 |

適用害虫と使用方法

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数 |
|----------------|------------------------------|-------|--------------|----------|---------|---------------------------------|-------------------------------------|
| メキャベツ | アブラムシ類 | 4000倍 | 100～300ℓ/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| 非結球レタス | | 32倍 | 1.6～2ℓ/10a | | | 無人航空機による散布 | |
| | | 150倍 | 4～5ℓ/10a | | | | |
| レタス | | 4000倍 | 100～300ℓ/10a | 収穫3日前まで | | 散布 | 3回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内) |
| | | 40倍 | 1.6～2ℓ/10a | | | 無人航空機による散布 | |
| | | 150倍 | 4～5ℓ/10a | | | | |
| 葉ごぼう | アブラムシ類 アザミウマ類 ウリハムシモドキ | 4000倍 | 100～300ℓ/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | |
| ごぼう | | | | 収穫7日前まで | | | |
| ほうれんそう | | | | 収穫前日まで | | 3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | |
| ふだんそう エンダイブ | | | | 収穫7日前まで | | | 2回以内 |

適用害虫と使用方法

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数 | |
|--|------------------------|------------|---|-----------------------------------|---------|------|-------------------------------------|------------|
| ねぎ | アザミウマ類 | 2000～4000倍 | 100～300ℓ/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 3回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は2回以内) | |
| | ネギハモグリバエ クロバネキノコバエ類 | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5～4ℓ) 当り0.5ℓ | 定植前日～定植時 | 1回 | 灌注 | | |
| たまねぎ | アザミウマ類 | | | | | | | 2000～4000倍 |
| わけぎ あさつき | アザミウマ類 | 2000～4000倍 | 100～300ℓ/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 3回以内 | 3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | |
| モロヘイヤ | | | | | | | 2000倍 | 収穫21日前まで |
| くわい | アブラムシ類 | 4000倍 | | 収穫14日前まで (ただし、露地栽培については開花期終了後) | 2回以内 | 3回以内 | 3回以内 (植付時の土壌混和は1回以内、植付後の処理は2回以内) | |
| れんこん | | | | 収穫14日前まで | 1回 | 1回 | | |
| せり科葉菜類 (コリアンダー(葉)、セルリー、パセリ、みつば、せりを除く) | | | | 収穫14日前まで | 1回 | 1回 | | |

適用害虫と使用方法

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数 | |
|----------------|------------------|-------|--------------|-------------------------------|---------|------|---------------------------------|---|
| コリアンダー(葉) | アブラムシ類 | 4000倍 | 100～300ℓ/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | |
| パセリ | | | | 収穫14日前まで | 1回 | | 2回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は1回以内) | |
| セルリー | | 2000倍 | | 収穫7日前まで | 3回以内 | | 3回以内 | |
| うど | | | | 根株養成期 ただし、 収穫60日前まで | | | | |
| きゅうり (施設栽培) | アブラムシ類 アザミウマ類 | 4000倍 | | 収穫前日まで | 3回以内 | | 散布 | 4回以内 (育苗期の株元散布および定植時の土壌混和は合計1回以内、散布および常温煙霧は合計3回以内) |
| メロン | | | | 収穫3日前まで (ただし、露地栽培については着果後) | | | | 4回以内 (育苗期の株元散布および定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内) |
| なす | | | | 収穫前日まで | | | | 2回以内 |

適用害虫と使用方法

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数 | | |
|-------------------|------------------|-------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|----------|
| かぼちゃ | アブラムシ類 | 4000倍 | 100～300ℓ/10a | 収穫前日まで (ただし、露地栽培については着果後) | 2回以内 | 散布 | 3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | | |
| すいか | | | | 収穫3日前まで (ただし、露地栽培については着果後) | 3回以内 | | 4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | | |
| ピーマン (施設栽培) | | | | 収穫前日まで | 2回以内 | | 3回以内 (育苗期の株元散布および定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) | | |
| トマト ミニトマト | アブラムシ類 コナジラミ類 | | | | アブラムシ類 アザミウマ類 | | しそ | アブラムシ類 | 3回以内 |
| オクラ (施設栽培) | | | | 収穫3日前まで | | | | | |
| しそ | アブラムシ類 | | | 2000倍 | アブラムシ類 コナジラミ類 | | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 |
| しそ科葉菜類 (しそを除く) | | | | | | | アブラムシ類 コナジラミ類 | | |
| しそ(花穂) | アブラムシ類 コナジラミ類 | 2000倍 | アブラムシ類 コナジラミ類 | 収穫45日前まで | 2回以内 | | | | |
| ふき | | | | | | アブラムシ類 コナジラミ類 | 2000倍 | アブラムシ類 コナジラミ類 | 収穫45日前まで |
| ふき(ふきのとう) | アブラムシ類 コナジラミ類 | 2000倍 | アブラムシ類 コナジラミ類 | 収穫45日前まで | 2回以内 | | | | |
| アスパラガス | | | | | | アザミウマ類 | 2000倍 | アザミウマ類 | 収穫前日まで |

適用害虫と使用方法

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数 | | | |
|------------------|------------------|-------|--------------|--|---------|------|---|----------|------|------|
| やなぎたで | アブラムシ類 | 4000倍 | 100～300ℓ/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | | | |
| 未成熟 そらまめ | | | | 収穫7日前まで (ただし、露地栽培 については 開花期終了後) | | | 3回以内 (定植時およびは種時の 土壌混和は合計 1回以内) | | | |
| 未成熟ささげ (施設栽培) | | | | 収穫前日まで | 2回以内 | | 3回以内 (定植時およびは種時の 土壌混和は合計1回以内、 散布は2回以内) | | | |
| はまぼうふう (葉) | | | | 収穫7日前まで | | | 2回以内 | | | |
| さんしょう(葉) | | | | アザミウマ類 | 4000倍 | | 100～300ℓ/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 |
| 食用プリムラ | | | | | | | | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 |
| 食用さくら(葉) | | | | アブラムシ類 | 4000倍 | | 100～300ℓ/10a | 収穫14日前まで | 1回 | 1回 |
| 食用かえで (葉) | | | | | | | | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 |
| きく(葉) (施設栽培) | | | | | | | | 発生初期 | 3回以内 | 3回以内 |
| 食用ぎく (施設栽培) | | | | アブラムシ類 アザミウマ類 | 4000倍 | | 100～300ℓ/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 |
| きく (施設栽培) | 発生初期 | 5回以内 | 5回以内 | | | | | | | |
| 食用ぎく (施設栽培) | アブラムシ類 アザミウマ類 | 2000倍 | 100～200ℓ/10a | 発生初期 | 5回以内 | 5回以内 | | | | |
| きく (施設栽培) | | | | 発生初期 | 5回以内 | 5回以内 | | | | |

適用害虫と使用方法

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イミダクロプリドを含む農薬の総使用回数 |
|-------------------------|------------------|-------|-------------------|------------------------------------|---------|------|-----------------------------------|
| 花き類・ 観葉植物 (きくを除く) | アブラムシ類 | 2000倍 | 100～200ℓ/10a | 発生初期 | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| ポインセチア (施設栽培) | アブラムシ類 コナジラミ類 | | | | | | |
| つつじ類 | ツツジゲンバイ | 5000倍 | 1ℓ/m ² | 発生初期 (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く) | 2回以内 | 株元灌注 | 5回以内 (株元灌注は2回以内、 土壌混和は2回以内) |
| | | | | 発生前 | | | |
| かえで | モミジニタイケアブラムシ | | | | | | |
| デイゴ | デイゴヒメコバチ | 2000倍 | 200～700ℓ/10a | 発生初期 (ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く) | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |