

適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	適用地帯	トリフルラリンを含む農薬の総使用回数	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数
陸稲	一年生雑草 (ツユクサ、キク科を除く)	4~6kg/ 10a	は種直後	1回	全面土壌 散布	砂壤土~ 埴土	関東以西	1回	1回
麦類							北海道を除く 全域	2回以内	
キャベツ はくさい			定植前(植穴掘前)				1回		
ねぎ			定植直後			全土壌	全域	2回以内	
たまねぎ			定植後 ただし、 収穫75日前まで						
たまねぎ (露地マルチ栽培)			定植前(マルチ前)			砂壤土~ 埴土	全域	2回以内	
にんにく			植付前~植付後 ただし、収穫90日前 まで						
にんじん			は種直後			北海道を除く 全域	1回		
ばれいしょ			植付後~萌芽前 (雑草発生前)						
さといも			植付直後			全域	2回以内 (土寄せ後の処理は1回以内)		

適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用土壌	適用地帯	トリフルラリンを含む農薬の総使用回数	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数
やまのいも	一年生雑草 (ツユクサ、キク科を除く)	4～6kg/ 10a	植付後～萌芽前 ただし、植付後30日 まで	1回	全面土壌 散布	全土壌	全域	1回	1回
こんにゃく			植付後、培土後 (萌芽前)			砂壌土～ 埴土		2回以内	