

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アクリナトリンを含む農薬の総使用回数
りんご	シンクイムシ類 キンモンホソガ アブラムシ類 ハダニ類	1000倍	200~700ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
なし	シンクイムシ類 アブラムシ類 ハダニ類 カメムシ類			収穫7日前まで			
かき	カメムシ類 アザミウマ類 ハダニ類 カキノヘタムシガ			収穫前日まで			
もも	モモハモグリガ シンクイムシ類 アブラムシ類 ハダニ類 カメムシ類 アザミウマ類 ドウガネブイブイ						
ネクタリン	モモハモグリガ シンクイムシ類 アブラムシ類 ハダニ類 カメムシ類 アザミウマ類						

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アクリナトリンを含む農薬の総使用回数
小粒核果類	ハダニ類	1000倍	200～700ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
ぶどう	アザミウマ類 ハダニ類 フタテンヒメヨコバイ			収穫7日前まで	4回以内		4回以内
いちじく	ハダニ類 アブラムシ類 ショウジョウバエ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ			収穫前日まで	2回以内		2回以内
マンゴー	アザミウマ類			収穫3日前まで			
すいか	アブラムシ類 ハダニ類		150～300ℓ /10a	収穫前日まで	5回以内		5回以内
メロン	アブラムシ類 ハダニ類	750倍					
いちご	アブラムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ	1000倍	150～300ℓ /10a	収穫前日まで	4回以内		4回以内
きゅうり	アブラムシ類 オンシツコナジラミ ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ						

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アクリナトリンを含む農薬の総使用回数
なす	アブラムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ ハスモンヨトウ	1000倍	150～300ℓ /10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内
トマト	オオタバコガ ミカンキイロアザミウマ				3回以内		3回以内
ミニトマト							
ピーマン とうがらし類	アブラムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ		2回以内	2回以内			
アスパラガス	オオタバコガ アブラムシ類 カメムシ類 ハダニ類		150～500ℓ /10a				
食用ぎく	アブラムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ ハスモンヨトウ ヨトウムシ		150～300ℓ /10a	発生初期 ただし、 収穫14日前まで	1回		1回
しそ科葉菜類	ハダニ類		100～300ℓ /10a	収穫3日前まで	2回以内		2回以内
パセリ	ネギアザミウマ			収穫7日前まで	3回以内		3回以内

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アクリナトリンを含む農薬の総使用回数
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ カンザワハダニ ヨモギエダシャク	1000倍	200~400ℓ /10a	摘採14日前まで	3回以内	散布	3回以内
きく	アブラムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ		150~300ℓ /10a	発生初期	5回以内		5回以内