

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テブコナゾールを含む農薬の総使用回数
小麦	雪腐小粒菌核病	16倍	0.8ℓ/10a	根雪前	1回	無人航空機による散布	3回以内 (根雪前は1回以内、融雪後は2回以内)
		500倍	25ℓ/10a				
		1000~2000倍	60~150ℓ/10a				
	なまぐさ黒穂病	1000倍					
	赤かび病 赤さび病	2000倍	25ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	
		500倍	0.8ℓ/10a				
	うどんこ病	2000倍	60~150ℓ/10a	16倍	0.8ℓ/10a	無人航空機による散布	
		16倍	0.8ℓ/10a				
大麦	黒点病 黒変病	2000倍	60~150ℓ/10a	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布	
							網斑病
	うどんこ病 赤かび病	16倍	0.8ℓ/10a				2000倍
2000倍		100~120ℓ/10a					
てんさい	葉腐病	2000~3000倍	100~120ℓ/10a			散布	
	褐斑病						

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テブコナゾールを含む農薬の総使用回数
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
ばれいしょ	夏疫病			収穫7日前まで			
豆類(種実、 ただし、だいず、 らっかせいを除く)	菌核病						
だいず		黒根腐病	200倍	100ℓ/10a	出芽4週間後以降 ただし、収穫 7日前まで	株元散布	
飼料用えんばく	裸黒穂病	600倍	種子1kg当り 希釈液30ml	は種前	1回	種子吹き付け処理 または塗沫処理	1回