

適用害虫と使用方法

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | チアクロプリドを含む農薬の総使用回数 | | |
|----------------------|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|------|--------------------|----|------|
| りんご | カメムシ類 リンゴワタムシ | 2000倍 | 200～700ℓ/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | | |
| | アブラムシ類 | 4000倍 | | | | | | | |
| | シンクイムシ類 | 2000～4000倍 | | | | | | | |
| | キンモンホソガ ギンモンハモグリガ コナカイガラムシ類 | 4000倍 | | | | | | | |
| なし | アブラムシ類 シンクイムシ類 | 2000～4000倍 | | 200～700ℓ/10a | 収穫前日まで | | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| | クワコナカイガラムシ | 4000倍 | | | | | | | |
| | カメムシ類 | 2000倍 | | | | | | | |
| もも | アブラムシ類 シンクイムシ類 モモハモグリガ | 2000～4000倍 | | 200～700ℓ/10a | 収穫3日前まで | | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| ネクタリン | | | | | 収穫前日まで | | | | |
| 小粒核果類 (うめ、すももを除く) | アブラムシ類 | 4000倍 | | 200～700ℓ/10a | 収穫前日まで | | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| | シンクイムシ類 | | | | | | | | |
| すもも | アブラムシ類 | 2000～4000倍 | 200～700ℓ/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | | |
| | モモノゴマダラノメイガ シンクイムシ類 | 4000倍 | | | | | | | |

適用害虫と使用方法

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | チアクロプリドを含む農薬の総使用回数 |
|-------------|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|------|--------------------|
| うめ | アブラムシ類 | 2000～4000倍 | 200～700ℓ/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| | アカマダラケシクスイ シンクイムシ類 | 4000倍 | | | | | |
| おうとう | オウトウショウジョウバエ | 2000倍 | | | | | |
| | ウメシロカイガラムシ | 4000倍 | | | | | |
| かき | カキノヘタムシガ コナカイガラムシ類 アザミウマ類 | 2000倍 | 100～300ℓ/10a | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |
| メロン | ウリノメイガ | 2000～4000倍 | | | | | |
| | アブラムシ類 | | | | | | 4000倍 |
| | ミナミキイロアザミウマ コナジラミ類 | | | | | | 2000～4000倍 |
| いちご | アブラムシ類 | 2000倍 | | | | | |
| | コナジラミ類 | | | | | | |
| ぶどう | チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ類 | 4000倍 | 200～700ℓ/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
| すいか ピーマン | アブラムシ類 | 2000～4000倍 | 100～300ℓ/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | |
| とうがらし類 | | 4000倍 | | | | | |

適用害虫と使用方法

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | チアクロプリドを含む農薬の総使用回数 |
|-----------|--|------------|--------------|---------|---------|------|--------------------|
| なす トマト | アブラムシ類 コナジラミ類 | 2000～4000倍 | 100～300ℓ/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ミニトマト | | 4000倍 | | | | | |
| きゅうり | アブラムシ類 | 2000～4000倍 | | | | | |
| | ウリノメイガ | 2000倍 | | | | | |
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 4000倍 | | 収穫7日前まで | | | |
| ズッキーニ | | | | 収穫前日まで | | | |
| こまつな | | | 収穫21日前まで | | | | |
| 茶 | チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ チャノホソガ コミカンアブラムシ | 2000～4000倍 | 200～400ℓ/10a | 摘採7日前まで | 1回 | | 1回 |
| | マダラカサハラハムシ | 2000倍 | | | | | |