

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリフロキシストロビンを含む農薬の総使用回数			
りんご	斑点落葉病 褐斑病	1500～3000倍	200～700ℓ /10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内			
	黒星病 輪紋病 黒点病 すす点病 すす斑病 炭疽病 腐らん病	2000～3000倍								
もも	灰星病 ホモプシス腐敗病	2000倍						2回以内	3回以内	3回以内
ネクタリン	黒星病 炭疽病									
小粒核果類 (すももを除く)	灰星病									
すもも	炭疽病									
おうとう	灰星病 炭疽病				収穫14日前まで		3回以内	3回以内		

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリフロキシストロピンを含む農薬の総使用回数
なし	輪紋病	2000倍	200～700ℓ /10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内
かき	炭疽病 落葉病 うどんこ病	2000～3000倍			3回以内		3回以内
ぶどう	晩腐病 黒とう病	500～1000倍	200～400ℓ /10a	休眠期	1回		1回
きゅうり	うどんこ病	2500倍	100～400ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内		3回以内
てんさい	根腐病	1500倍	100～300ℓ /10a	収穫21日前まで			
	葉腐病 褐斑病	1500～2000倍					
		400～500倍	25ℓ/10a				
かんしょ	基腐病	250倍	100ℓ/10a	植付前	1回	全面散布 土壌混和	1回
		125倍	50ℓ/10a				
		10倍	4ℓ/10a				
茶	炭疽病 輪斑病 新梢枯死症 もち病	2000～3000倍	200～400ℓ /10a	摘採14日前まで	2回以内	散布	2回以内
	褐色円星病	2000倍					