

## 適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テブコナゾールを含む農薬の総使用回数
りんご	モニリア病 斑点落葉病 黒点病 うどんこ病 褐斑病 灰色かび病 赤星病	2000倍	200～700ℓ /10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	黒星病	2000～4000倍					
おうとう	灰星病 炭疽病 黒斑病 褐色せん孔病	2000倍		収穫前日まで			
もも ネクタリン	灰星病 ホモブシス腐敗病 黒星病 うどんこ病 炭疽病						
かき	灰色かび病						
かき(葉)	炭疽病 うどんこ病 落葉病						
		3000倍					

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テブコナゾールを含む農薬の総使用回数
なし	輪紋病 黒斑病 うどんこ病	2000倍	200~700ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	赤星病	2000~4000倍					
黒星病	2000倍						
小粒核果類 (うめを除く)		灰星病					
うめ	黒星病 すす斑病 灰星病	2000倍					
ぶどう	晩腐病 黒とう病 さび病 灰色かび病 うどんこ病 すす点病 褐斑病 白腐病		2000倍				
	いちじく	株枯病		5~10ℓ/樹	生育期 ただし、 収穫前日まで	灌注	

## 適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テブコナゾールを含む農薬の総使用回数
ねぎ	さび病 黒斑病	1000倍	150～300ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
		8倍	1.6ℓ/10a			無人航空機による散布	
		16倍	2.4～3.2ℓ/10a			散布	
わけぎ あさつき		1000倍	150～300ℓ/10a				
たまねぎ	灰色腐敗病 灰色かび病	8倍	1.2～2ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		16倍	2.4～4ℓ/10a			散布	
しそ	さび病	4000倍	150～300ℓ/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内
にんにく	さび病 葉枯病 白斑葉枯病 黄斑病	1000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		8倍	0.8～2.4ℓ/10a			散布	
		16倍	1.6～4.8ℓ/10a				
キャベツ	菌核病			収穫前日まで			
にら	さび病	1000～2000倍	100～300ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
にら(花茎)				収穫前日まで			

## 適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テブコナゾールを含む農薬の総使用回数
しょうが	白星病	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
		32倍	3.2ℓ/10a			無人航空機による散布	
		50倍	3.2～6.5ℓ/10a				
		100倍	5～13ℓ/10a				
未成熟そらまめ	さび病	4000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
やまのいも やまのいも(むかご)	炭疽病 葉渋病	1000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
		16倍	1.6～3.2ℓ/10a				
		32倍	3.2～6.4ℓ/10a				
茶	炭疽病 もち病 褐色円星病	2000～3000倍	200～400ℓ/10a	摘採7日前まで	2回以内	散布	2回以内
	新梢枯死症 網もち病	2000倍					
ホップ	うどんこ病	1000倍	200～700ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内		3回以内
ゆり	乾腐病	50倍	—	植付前または 貯蔵前	1回	1分間球根 浸漬	1回
チューリップ	球根腐敗病			植付前		15分間球根 浸漬	
りんどう	葉枯病 花腐菌核病	2000倍	200～300ℓ/10a	発病初期	5回以内	散布	5回以内