

適用害虫と使用方法

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エチプロールを含む農薬の総使用回数	
稲 (箱育苗)	—	イネドロオイムシ	100～200倍	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り0.5ℓ	移植3日前 ～移植当日	1回	灌注	2回以内 (移植時までの 処理は 1回以内)	
稲		ウンカ類 カメムシ類 イネドロオイムシ	500倍	25ℓ/10a	60～200ℓ/10a	収穫14日前 まで	2回以内	散布	2回以内 (は種時(直播) または移植時 までの処理は 1回以内)
		イナゴ類 イネドロオイムシ	2000倍	1000～2000倍					
		ウンカ類 カメムシ類	8～16倍						
		イネドロオイムシ	16倍	0.8ℓ/10a	空中散布				
		カメムシ類	2000倍	100～300ℓ/10a	無人ヘリコプター による散布				
だいず		カメムシ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前 まで	2回以内	散布		
えだまめ		カメムシ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前 まで				
かんきつ		チャノキイロアザミウマ アブラムシ類	1000～2000倍	200～700ℓ/10a	収穫21日前 まで	2回以内	散布	2回以内	
		カネタタキ	2000倍						

適用害虫と使用方法

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エチプロールを含む農薬の総使用回数
りんご	—	アブラムシ類	1000～4000倍	200～700ℓ/10	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
		モモシクイガ キンモンホソガ ギンモンハモグリガ	1000～2000倍					
カメムシ類		2000倍	200～400ℓ/10a		収穫7日前まで			
カメムシ類 アザミウマ類				200～400ℓ/10a	摘採7日前まで			
マンゴー			チャノキイロアザミウマ			200～400ℓ/10a		摘採7日前まで
茶			チャノキイロアザミウマ ツマグロアオカスミカメ チャノホソガ					
水田作物、畑作物(休耕田)	ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田	カメムシ類		60～200ℓ/10a	—	2回以内		2回以内