

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロメシフェンを含む農薬の総使用回数
りんご	リンゴハダニ ナミハダニ リンゴサビダニ	2000倍	200～700ℓ/10a	収穫前日まで	1回	散布	1回
もも ネクタリン	ハダニ類 モモサビダニ						
小粒核果類 おうとう	ハダニ類						
なし	ハダニ類 ニセナンサビダニ						
かんきつ	ミカンハダニ ミカンサビダニ チャノホコリダニ チャノキイロアザミウマ	24倍	8ℓ/10a	1回	無人航空機 による散布	1回	
		30倍	10ℓ/10a				
		36倍	12ℓ/10a				
		48倍	16ℓ/10a				
ぶどう	ハダニ類	2000倍	200～700ℓ/10a	果実肥大期（大豆大期） ～収穫前日	1回	散布	
茶	カンザワハダニ チャノナガサビダニ チャトゲコナジラミ チャノホコリダニ		200～400ℓ/10a	摘採7日前まで			

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロメシフェンを含む農薬の総使用回数
りんどう	ナミハダニ	2000倍	100~300ℓ/10a	発生初期	1回	散布	1回
チューリップ	チューリップサビダニ	500倍	—	植付前		15分間球根浸漬	