

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	イミダクロプリドを含む 農薬の総使用回数	スピノサドを含む 農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	ウンカ類 イネヒメハモグリバエ ツマグロヨコバイ イネミズゾウムシ イネドロオウムシ フタオビコヤガ	100倍	育苗箱 (30×60×3cm、使用土 壤約5ℓ)1箱当り0.5ℓ	移植3日前 ～移植当日	1回	灌注	3回以内 (移植時までの処理は 1回以内、本田での 散布は2回以内)	1回
キャベツ	アザミウマ類 アブラムシ類 アオムシ コナガ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ		セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (30×60cm、使用土 壤約1.5～4ℓ)当り0.5ℓ	定植3日前 ～定植当日			3回以内 (定植時までの処理は 1回以内、定植後の 処理は2回以内)	4回以内 (定植前は1回以内、 本圃では3回以内)
はくさい	アブラムシ類 コナガ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ						4回以内 (育苗期の灌注は 1回以内、定植時の土 壌混和は1回以内、定植後の 処理は2回以内)	
ブロッコリー	アブラムシ類 アオムシ ハイマダラノメイガ コナガ		200倍	定植当日			3回以内 (定植時までの処理は1回 以内、定植後の処理は 2回以内)	
レタス	ナモグリバエ オオタバコガ							