

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルオピコリドを含む農薬の総使用回数	ベンチアバリカルブイソプロピルを含む農薬の総使用回数
かんきつ	褐色腐敗病	5000倍	200～700ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
ぶどう	べと病			収穫30日前まで				
きゅうり			100～300ℓ/10a	収穫前日まで				
はくさい	白さび病			収穫7日前まで				
レタス	べと病	500倍	セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4ℓ)当り0.5ℓ	定植前日～定植当日	1回	灌注	3回以内 (灌注は1回以内、 散布は2回以内)	3回以内 (灌注は1回以内、 散布は2回以内)
非結球レタス		5000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布		
		500倍	セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4ℓ)当り0.5ℓ	定植前日～定植当日	1回	灌注		
		5000倍		収穫前日まで	2回以内			
たまねぎ	白色疫病	3000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
	べと病							
		24倍	1.6ℓ/10a			無人航空機による散布		

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルオピコリドを含む農薬の総使用回数	ベンチアバリカルブイソプロピルを含む農薬の総使用回数
ほうれんそう	べと病	5000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
バジル				収穫前日まで				