

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テブコナゾールを含む農薬の総使用回数	トリフロキシストロビンを含む農薬の総使用回数
小麦	雪腐小粒菌核病	1000倍	60～150ℓ/10a	根雪前	1回		3回以内 (根雪前は1回以内、融雪後は2回以内)	3回以内 (根雪前は1回以内、融雪後は2回以内)
	赤かび病			収穫21日前まで	2回以内			
かんきつ	黒点病 そうか病 灰色かび病	1500～2000倍	200～700ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
	炭疽病(さび果) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(青かび病) 汚れ果症	1500倍						
	黒点病 そうか病 灰色かび病 炭疽病(さび果) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(青かび病) 汚れ果症	24倍	4～10ℓ/10a			無人航空機による散布		
		32倍	6～14ℓ/10a					
		36倍	10～16ℓ/10a					
		50倍	7.5～22ℓ/10a					
		100倍	15～44ℓ/10a					
200倍	30～88ℓ/10a							

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テブコナゾールを含む農薬の総使用回数	トリフロキシストロビンを含む農薬の総使用回数
かき	落葉病 灰色かび病	2000倍	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
	炭疽病 うどんこ病							
もも	灰星病 黒星病 ホモプシス腐敗病							
	黒星病 すす斑病 灰色かび病	2回以内	2回以内					