

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ミカンハダニ ミカンコナジラミ	2000倍	200～700ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	アブラムシ類 アザミウマ類 カイガラムシ類 サビダニ類 チャノホコリダニ	32倍	4～6ℓ/10a			無人航空機による散布	
		40倍	6～8ℓ/10a				
		50倍	8～10ℓ/10a				
		80倍	10～15ℓ/10a				
		100倍	15～20ℓ/10a				
		160倍	20～30ℓ/10a				
		250倍	30～40ℓ/10a				
		320倍	40～50ℓ/10a				
りんご	アブラムシ類 カイガラムシ類 ハダニ類 リンゴサビダニ リンゴワタムシ	2000倍	200～700ℓ/10a	収穫14日前まで		散布	

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数
なし	アザミウマ類 アブラムシ類 カイガラムシ類 ハダニ類 ニセナシサビダニ	2000倍	200～700ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
びわ	ビワキジラミ			収穫21日前まで	2回以内		2回以内
ぶどう	アザミウマ類 カイガラムシ類 ハダニ類 ブドウサビダニ ブドウハモグリダニ			収穫7日前まで	3回以内		3回以内
かき	アザミウマ類 カイガラムシ類			収穫14日前まで			
パイナップル	パイナップルコナカイガラムシ						
もも ネクタリン 小粒核果類	アブラムシ類 カイガラムシ類 ハダニ類			収穫7日前まで	2回以内		2回以内
おうとう	カイガラムシ類 ハダニ類						
オリーブ	カイガラムシ類			収穫90日前まで			
オリーブ(葉)							

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アザミウマ類 アオムシ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	アブラムシ類 コナガ	2000～4000倍					
	アザミウマ類 アブラムシ類 アオムシ コナガ	24倍	1.6～1.7ℓ/10a			無人航空機 による散布	
		32倍	1.7～2ℓ/10a				
		40倍	2～2.8ℓ/10a				
		50倍	2.8～3.5ℓ/10a				
		64倍	3.5～4.5ℓ/10a				
		80倍	4.5～5.5ℓ/10a				
		100倍	5.5～7ℓ/10a				
		125倍	7～8.5ℓ/10a				
		160倍	8.5～11ℓ/10a				
		200倍	11～14ℓ/10a				
	250倍	14～17ℓ/10a					
320倍	17～20ℓ/10a						
はくさい	アブラムシ類 コナガ	4000倍	100～300ℓ/10a			散布	

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数
ブロッコリー	アザミウマ類 アオムシ コナガ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	アブラムシ類	2000～4000倍					
	アザミウマ類 アブラムシ類	24倍	1.6～1.7ℓ/10a			無人航空機 による散布	
		32倍	1.7～2ℓ/10a				
		40倍	2～2.8ℓ/10a				
		50倍	2.8～3.5ℓ/10a				
		64倍	3.5～4.5ℓ/10a				
		80倍	4.5～5.5ℓ/10a				
		100倍	5.5～7ℓ/10a				
		125倍	7～8.5ℓ/10a				
		160倍	8.5～11ℓ/10a				
		200倍	11～14ℓ/10a				
		250倍	14～17ℓ/10a				
320倍	17～20ℓ/10a						

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数
レタス	アザミウマ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	アブラムシ類	2000～4000倍					
	アザミウマ類 アブラムシ類	24倍	1.6～1.7ℓ/10a			無人航空機 による散布	
		32倍	1.7～2ℓ/10a				
		40倍	2～2.8ℓ/10a				
		50倍	2.8～3.5ℓ/10a				
		64倍	3.5～4.5ℓ/10a				
		80倍	4.5～5.5ℓ/10a				
		100倍	5.5～7ℓ/10a				
		125倍	7～8.5ℓ/10a				
		160倍	8.5～11ℓ/10a				
		200倍	11～14ℓ/10a				
		250倍	14～17ℓ/10a				
		320倍	17～20ℓ/10a				

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数
非結球レタス	アザミウマ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
	アブラムシ類	2000～4000倍					
	アザミウマ類 アブラムシ類	24倍	1.6～1.7ℓ/10a			無人航空機 による散布	
		32倍	1.7～2ℓ/10a				
		40倍	2～2.8ℓ/10a				
		50倍	2.8～3.5ℓ/10a				
		64倍	3.5～4.5ℓ/10a				
		80倍	4.5～5.5ℓ/10a				
		100倍	5.5～7ℓ/10a				
		125倍	7～8.5ℓ/10a				
		160倍	8.5～11ℓ/10a				
		200倍	11～14ℓ/10a				
		250倍	14～17ℓ/10a				
		320倍	17～20ℓ/10a				
ほうれんそう	アブラムシ類 ホウレンソウケナガコナダニ	2000倍	100～300ℓ/10a			散布	

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数
かぼちゃ	アブラムシ類 コナジラミ類 ハダニ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
		24倍	1.6～3.6ℓ/10a			無人航空機による散布	
		50倍	3.6～7.5ℓ/10a				
		100倍	7.5～15ℓ/10a				
きゅうり	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類 ハダニ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	1回	散布	3回以内 (灌注は1回以内)
	アザミウマ類 ハダニ類	500倍	50ml/株	育苗期後半～ 定植当日		株元灌注	
	アブラムシ類 コナジラミ類		25～50ml/株				
メロン すいか	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類 ハダニ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内 (灌注は1回以内)
	アザミウマ類 ハダニ類	500倍	50ml/株	育苗期後半～ 定植当日	1回	灌注	
	アブラムシ類		25～50ml/株				
ズッキーニ	アブラムシ類 コナジラミ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数
なす	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ ハダニ類 コナカイガラムシ類 うどんこ病	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内 (灌注は1回以内)
	アザミウマ類 チャノホコリダニ ハダニ類 うどんこ病	500倍	50ml/株	育苗期後半～ 定植当日	1回	灌注	
	アブラムシ類 コナジラミ類		25～50ml/株				
ピーマン とうがらし類	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ ハダニ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	
	アザミウマ類 チャノホコリダニ ハダニ類	500倍	50ml/株	育苗期後半～ 定植当日	1回	灌注	
	アブラムシ類 コナジラミ類		25～50ml/株				

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数
トマト ミニトマト	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類 トマトサビダニ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
アスパラガス	アザミウマ類 コナジラミ類 ハダニ類						
未成熟そらまめ	アザミウマ類						
いちご	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類	500倍	50ml/株	定植3日前～ 定植当日	1回	灌注	3回以内 (灌注は1回以内)
	チャノホコリダニ						
	アザミウマ類 ハダニ類 うどんこ病						
	アブラムシ類 コナジラミ類	25～50ml/株	育苗期後半～ 定植当日				
	アザミウマ類 アブラムシ類 クロバネキノコバエ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ ハダニ類	250倍	25ml/株				

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数	
みょうが (花穂)	アブラムシ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布 散布	3回以内	
みょうが (茎葉)				みょうが(花穂)の 収穫前日まで ただし、花穂を収穫 しない場合にあって は開花期終了まで				
しそ				アザミウマ類				収穫14日前まで
にんにく	チューリップサビダニ	4000倍	100～300ℓ/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内	
ねぎ	アザミウマ類	2000倍						
ばれいしょ	アブラムシ類	4000倍		100～300ℓ/10a				収穫7日前まで
		64倍	1.6～3ℓ/10a					
		100倍	3～5ℓ/10a					
		160倍	5～8ℓ/10a					
		200倍	8～10ℓ/10a					
		250倍	10～12ℓ/10a					
		320倍	12～16ℓ/10a					
		400倍	16～20ℓ/10a					

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数
さといも	アブラムシ類 ハダニ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
		8倍	0.8～1.2ℓ/10a			無人航空機 による散布	
		12倍	1.6ℓ/10a				
		24倍	3.2ℓ/10a				
てんさい	アブラムシ類	2000～4000倍	100～300ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
		16倍	1.6～2.1ℓ/10a			無人航空機 による散布	
		20倍	1.6～2.6ℓ/10a				
40倍	3.6～5.3ℓ/10a						
チューリップ	チューリップサビダニ	4000倍	100～300ℓ/10a	摘花後～球根掘取り前まで	2回以内	散布	2回以内