

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テブコナゾールを含む農薬の総使用回数	フルオピラムを含む農薬の総使用回数
りんご	うどんこ病 黒点病 黒星病 赤星病 斑点落葉病 モニリア病	2000～ 3000倍	200～700ℓ /10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
	灰色かび病 褐斑病 すす点病 すす斑病	2000倍						
なし	赤星病 輪紋病 黒星病 黒斑病	2000～ 3000倍		収穫前日まで				
	褐色斑点病 うどんこ病	2000倍						
もも	うどんこ病	3000倍						
ネクタリン うめ	灰星病 黒星病							

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テブコナゾールを含む農薬の総使用回数	フルオピラムを含む農薬の総使用回数
小粒核果類 (うめを除く)	灰星病	3000倍	200~700ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
おうとう				褐色せん孔病				
ぶどう	うどんこ病 灰色かび病 晩腐病			収穫14日前まで				
あずき	灰色かび病	1000倍	100~150ℓ /10a	収穫7日前まで				
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病			収穫前日まで				