

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルオピラムを含む農薬の総使用回数
りんご	うどんこ病 黒星病 黒点病 斑点落葉病 モニリア病 灰色かび病	4000倍	200~700ℓ /10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
なし	黒星病 黒斑病			収穫前日まで			
もも ネクタリン	黒星病						
小粒核果類 おうとう	灰星病						
ぶどう	灰色かび病	2000倍	100~150ℓ /10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
豆類(種実、 ただし、 らっかせいを除く)	菌核病 灰色かび病			収穫7日前まで			
たまねぎ	小菌核病 灰色かび病 灰色腐敗病			2000~ 3000倍			

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルオピラムを含む農薬の総使用回数
はくさい	白斑病 黒斑病	2000～ 3000倍	100～300ℓ /10a	収穫7日前まで	1回	散布	1回
キャベツ	菌核病			収穫14日前まで			
レタス	灰色かび病 菌核病						
リーフレタス				収穫前日まで			
いちご	灰色かび病 うどんこ病						