

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数	イソチアニルを含む農薬の総使用回数	ペンフルフェンを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病 もみ枯細菌病 紋枯病 白葉枯病 内穎褐変病 イネドロオイムシ イネツトムシ ニカメイチュウ フタオビコヤガ コブノメイガ イネミズゾウムシ ツマグロヨコバイ イナゴ類 ヒメトビウンカ	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ)1箱当り50g	は種時(覆土前)～移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する。	1回	3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)	1回
	穂枯れ(ごま葉枯病菌) 疑似紋枯症(褐色紋枯病菌) 疑似紋枯症(赤色菌核病菌) 疑似紋枯症(褐色菌核病菌) イネヒメハモグリバエ	高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ)1箱当り50～100g)	移植3日前～移植当日					
		育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ)1箱当り50g	移植当日					