

## 適用雑草と使用方法

| 作物名  | 適用雑草名  | 使用量     | 使用時期                                | 本剤の使用回数 | 使用方法                          | エトキシスルフロンを含む農薬の総使用回数 | クロメプロップを含む農薬の総使用回数 | トリアファモンを含む農薬の総使用回数 | フェントラザミドを含む農薬の総使用回数 |
|------|--|---------|-------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 移植水稻 | 一年生雑草<br>マツバイ<br>ホタルイ<br>ミズガヤツリ<br>ウリカワ<br>ヒルムシロ<br>セリ | 1kg/10a | 移植時                                 | 1回      | 田植同時散布機で施用                    | 2回以内                 | 2回以内               | 2回以内               | 1回                  |
|      | オモダカ<br>クログワイ<br>コウキヤガラ<br>キシウスズメノヒエ                   |         | 移植直後～<br>ノビエ3葉期<br>ただし、<br>移植後30日まで |         | 湛水散布<br>または<br>無人航空機<br>による散布 |                      |                    |                    |                     |
| 直播水稻 | 一年生雑草<br>ホタルイ<br>ミズガヤツリ<br>ウリカワ<br>ヒルムシロ<br>セリ         |         | 稲1葉期～<br>ノビエ3葉期<br>ただし、<br>収穫90日前まで |         |                               |                      |                    |                    |                     |