

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テトラニリプロールを含む農薬の総使用回数	イソチアニルを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病 白葉枯病 内穎褐変病 もみ枯細菌病 イネドロオウムシ ツマグロヨコバイ コブノメイガ イネツトムシ ニカメイチュウ イネミズゾウムシ フタオビコヤガ イナゴ類	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ)1箱当り 50～75g	は種前	1回	育苗箱の床土または覆土に均一に混和する。	1回	3回以内 (移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)
		高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ)1箱当り50～100g)	は種時(覆土前)～移植当日		育苗箱の上から均一に散布する。		
	苗腐敗症(もみ枯細菌病菌) 苗立枯細菌病	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ)1箱当り 50～75g	は種前		育苗箱の床土または覆土に均一に混和する。		
		高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ)1箱当り50～100g)	は種時(覆土前)		育苗箱の上から均一に散布する。		

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テトラニリプロールを含む農薬の総使用回数	イソチアニルを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	穂枯れ(ごま葉枯病菌) イネヒメハモグリバエ	育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ)1箱当り 50～75g	移植3日前～ 移植当日	1回	育苗箱の上 から均一に 散布する。	1回	3回以内 (移植時までの処理は 1回以内、本田では 2回以内)
		高密度には種する場 合は1kg/10a(育苗箱 (30×60×3cm、使用土 壌約5ℓ)1箱当り50～ 100g)					