

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テトラニリプロールを含む農薬の総使用回数
稲 (乾田直播 水稻を除く)	コブノメイガ ツマグロヨコバイ	乾燥種もみ1kg当り 原液11ml (原液55ml/10aまで)	は種前 (浸種前)	1回	塗沫処理 (種子被覆剤を加用)	1回
	イネドロオイムシ イネヒメハモグリバエ フタオビコヤガ キリウジガガンボ イネツトムシ イネミズゾウムシ ニカメイチュウ		は種前 (浸種後)		コーティング中または コーティング後の 種もみに塗沫処理	
乾田直播水稻	コブノメイガ ツマグロヨコバイ イネドロオイムシ イネヒメハモグリバエ フタオビコヤガ キリウジガガンボ		は種前 (浸種前)		塗沫処理 (種子被覆剤を加用)	
	イネドロオイムシ イネヒメハモグリバエ フタオビコヤガ キリウジガガンボ イネツトムシ イネミズゾウムシ ニカメイチュウ		は種前 (浸種後)		コーティング中または コーティング後の 種もみに塗沫処理	
	イネツトムシ イネミズゾウムシ ニカメイチュウ	乾燥種もみ1kg当り 原液6~11ml (原液55ml/10aまで)	は種前 (浸種前)	塗沫処理 (種子被覆剤を加用)		