

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テトラニリプロールを含む農薬の総使用回数	イソチアニルを含む農薬の総使用回数	ペンフルフェンを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病 イネミズゾウムシ	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ) 1箱当り50g	は種前	1回	育苗箱の床土または覆土に均一に混和する。	1回	3回以内 (移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)	1回
	紋枯病 白葉枯病 イネドロオイムシ ニカメイチュウ コブノメイガ イネツトムシ フタオビコヤガ ツマグロヨコバイ イネヒメハモグリバエ イナゴ類	高密度には種する場合は1kg/10a (育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ)1箱当り50～100g)	は種時 (覆土前)～ 移植当日		育苗箱の上から均一に散布する。			
		育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ)1箱当り50g						
	内穎褐変病 もみ枯細菌病 穂枯れ(ごま葉枯病菌)	高密度には種する場合は1kg/10a (育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ)1箱当り50～100g)	移植3日前～移植当日					