

恵みには、 かかせないもの。



ロブラル® 水和剤

2024年3月
非結球レタスへ
適用拡大!



野菜類や果樹類など
多くの作物に登録がある。
環境にもやさしい信頼の定番殺菌剤。

農林水産省登録:第14212号

●成分: イプロジオン.....50.0% 殺菌剤分類 2

●毒性: 普通物 (毒劇物に該当しないものを指すという通称)



製品情報はこちら



FMC

FMC、FMCロゴ、®を付した商標は、FMC Corporationまたはその米国およびその他の国の子会社・関連会社の登録商標です。

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期*	使用回数*		使用方法						
					本剤	イプロジオン							
なし	黒斑病	1,000~1,500	200~700ℓ/10a	14日	5回	5回	散布						
もも	灰星病	1,000		前日	3回	3回							
ネクタリン	ホモブシス腐敗病	1,000											
おうとう	灰星病	1,000~1,500											
	黒かび病	1,000											
すもも	灰星病	1,000~1,500		3日	2回	2回							
あんず	灰色かび病			前日									
びわ	灰色かび病、環紋葉枯病			45日									
うめ	菌核病			14日									
食用桑(果実)	果実軟腐病	1,000		前日	4回	4回							
キウイフルーツ	灰色かび病	1,000~1,500	開花期~落花期										
	貯蔵病害(灰色かび病)	1,500~2,000	前日										
ぶどう	灰色かび病、白腐病	1,000~1,500	開花期~幼果期 但し、60日	3回	3回								
	黒とう病												
マンゴー	灰色かび病	1,000	7日										
はとむぎ	葉枯病	8	21日			無人航空機による散布							
いちご	灰色かび病、黒斑病、菌核病	1,500	100~300ℓ/10a	前日	4回	5回 (種子粉衣は1回、 は種後は4回)	散布						
ピーマン	灰色かび病	1,000~1,500						7日	1回	2回(種子粉衣は1回、 は種後は1回)	種子粉衣		
	菌核病	1,000											
なす	灰色かび病、黒枯病	1,000~1,500										14日	3回
	菌核病、すすかび病、褐色斑点病	1,000											
きゅうり	灰色かび病	1,000~1,500		は種前									
すいか	菌核病、つる枯病	1,000		14日									
メロン	ズッキーニ	1,000~1,500		14日									
キャベツ	菌核病、株腐病	1,000		14日									
薬用になじん	灰色かび病、斑点病	1,000~1,500		は種前									
にんじん	斑点病、黒葉枯病	種子重量の0.5%	は種前										
漬物用メロン	菌核病、つる枯病	1,000	14日	1回	2回(種子粉衣は1回、 は種後は1回)								
オクラ	黒斑病、灰色かび病	2,000	100~300ℓ/10a	前日	3回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)	散布						
トマト	灰色かび病	1,000~1,500						3日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)			
ミニトマト	輪紋病、斑点病	1,000									7日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)
ごぼう	菌核病	1,000											
あしたば	葉枯病	1,000~1,500		21日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)							
たまねぎ	灰色かび病、灰色腐敗病、黒斑病	1,000~1,500					14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)				
くきちしゃ	灰色かび病	1,000								14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)	
	菌核病、すそ枯病	1,000~1,500											14日
レタス	灰色かび病	1,000		14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)							
	菌核病、すそ枯病	1,000~1,500					14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)				
非結球レタス	灰色かび病	1,000~1,500	14日							1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)		
しそ、バジル	菌核病	2,000										14日	1回
はくさい	菌核病	1,000		14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)							
	白斑病、黒斑病	1,000~1,500					14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)				
ねぎ	ボトリチス葉枯症、黒斑病、小菌核腐敗病	500	14日							1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)		
	小菌核腐敗病	500~1,000										14日	1回
白絹病	白絹病	500~1,000		14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)							
あざつき	ボトリチス葉枯症、黒斑病、小菌核腐敗病	1,000~1,500					14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)				
わけぎ	灰色かび病	1,000	14日							1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)		
らっきょう	菌核病、夏疫病	125										14日	1回
ばれいしょ	黒あざ病	1,500		14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)							
ざやえんどう	灰色かび病	1,000					14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)				
えだまめ	灰色かび病、菌核病	1,000	14日							1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)		
未成熟そらまめ	赤色斑点病	1,000										14日	1回
実えんどう	灰色かび病	1,000		14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)							
だいず	灰色かび病、菌核病	1,000					14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)				
あずき	灰色かび病	1,000~1,500	14日							1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)		
いんげんまめ	菌核病	500~1,000										14日	1回
らっかせい	灰色かび病	1,000~1,500		14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)							
てんさい	葉腐病	500~1,000					14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)				
食用ゆり	葉枯病	1,000	14日							1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)		
ししとう	灰色かび病	2,000										14日	1回
とうがらし類 (ししとうを除く)	灰色かび病、灰色腐敗病、黒斑病	1,000		14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)							
葉たまねぎ	白斑病	1,500					14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)				
非結球はくさい	灰色かび病	1,000	14日							1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)		
未成熟ささげ	菌核病	1,000										14日	1回
葉ごぼう	根株養成期 地上部切り取り前 但し、35日	1,000		14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)							
のさわな	根株養成期 地上部切り取り前 但し、35日	1,000					14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)				
みずな	根株養成期 地上部切り取り前 但し、35日	1,000	14日							1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)		
みつば(軟化栽培)	根株養成期 地上部切り取り前 但し、35日	1,000										14日	1回
畑わさび	墨入病	1,000		14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)							
	500	3ℓ/㎡					14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)				
うど	黒斑病	1,000	14日							1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)		
	菌核病	6ℓ/㎡										14日	1回
アスパラガス	茎枯病、斑点病、褐斑病	2,000		14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)							
茶	灰色かび病	1,000~1,500					14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)				
スターチス	苗腐敗症(アルタナリア菌)	250~500	14日							1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)		
りんどう	1,000	100~300ℓ/10a										14日	1回
たばこ	菌核病	1,500~2,000		14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)							
芝	葉腐病(ブラウンパッチ)、 ヘルミントスポリウム葉枯病	200ml/株					14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)				
日本芝	葉腐病(ラーシパッチ)	1,000~1,500	14日							1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)		
西洋芝(ベントグラス)	タラースポット病	1ℓ/㎡										14日	1回
野菜類、花き類	アルタナリア菌による病害	種子重量の0.5%		14日	1回	4回 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)							

(常温 煙霧)	適用場所	作物名	適用病害名	10アール当り使用量		使用時期*	使用回数*		使用方法
				薬量(g)	使用液量(ℓ)		本剤	イプロジオン	
				200	5	前日	4回	5回(種子粉衣は1回、 は種後は4回)	
	温室、ガラス室、 ビニールハウス等の 密閉できる場所	きゅうり トマト、ミニトマト ぶどう	灰色かび病	200	6	開花期~幼果期、但し、60日	3回	4回(種子粉衣は1回、 は種後は3回) 3回	常温煙霧

*印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫(摘採)前の日数と、本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

バイエル クロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 <https://cropscience.bayer.jp/>

お客様相談室 ☎0120-575-078 9:00~12:00、13:00~17:00
土日祝日および会社休日を除く

F-2069 24.03.NY