

幅広い適用作物と 優れた残効性。 主要害虫の防除に！



アドマイヤー[®] フロアブル



- かんきつのアブラムシ類、ミカンハモグリガ、チャノキイロアザミウマ、野菜のアブラムシ類、花きのアブラムシ類、コナジラミ類などを長期間防除します。
- 果樹(かんきつ、もも等)のカメムシ類による果実被害を防止します。
- 登録作物も多く、フロアブルタイプなので薬液の汚れも少ない使いやすい薬剤です。



ワタアブラムシ



オンシツコナジラミ



ミカンハモグリガ



アカマルカイガラムシ



チャノキイロアザミウマ



製品情報の詳細は
こちらから



250mL入



100mL入



®アドマイヤーはバイエルグループの登録商標

■適用害虫および使用方法

2021年9月現在の登録内容

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用 液量	使用 時期	使用回数*		使用方法			
					本剤	イミダクロプリド				
か ん き つ	カイガラムシ類 アザミウマ類 ミカンハモグリガ カメムシ類 アブラムシ類 ゴマダラカミキリ成虫	2,000~5,000	200~700 ℓ/10a	14日 ※1	3回	3回	散 布			
	ミカンバエ	2,000~4,000								
	ミカンキジラミ	2,000								
	アブラムシ類 アザミウマ類	80	8~20 ℓ/10a							
	カメムシ類 ゴマダラカミキリ成虫 ミカンハモグリガ ミカンバエ ミカンキジラミ	40	4~10 ℓ/10a							
			20				4~5 ℓ/10a			無人航空機 による散布
	び わ	アブラムシ類 カメムシ類	2,000				7日 ※1	2回	2回	散 布
	も も	アブラムシ類 モモハモグリガ カメムシ類	5,000				3日 ※1			
	な し	アブラムシ類					7日※1			
	あ ん す	アブラムシ類					21日※1			
ぶ ど う	アザミウマ類		前日※1							
キウイフルーツ	カメムシ類	2,000	前日							
いちよう(種子)	イチヨウヒガビロウドカミキリ成虫									
ア セ ロ ラ		4,000	7日	3回	3回	散 布				
ピ タ ヤ	アブラムシ類	2,000					100~300 ℓ/10a			
アマランサス(莖葉)		5,000								
キ ノ ア	カメノコハムシ	4,000								
キャベツ		32					1.6~2ℓ/10a			
は く さい		150					4~5ℓ/10a			
		4,000					100~300ℓ/10a			
ブロッコリー		2,000					100~300ℓ/10a			
		24					1.6~2ℓ/10a			
		80					4~5ℓ/10a			
畑 わ さ び	アブラムシ類	4,000	100~300 ℓ/10a	7日	3回	3回	散 布			
わ さ び				畑育苗期						
だ い こん				14日						
み す な				3日						
非結球メキャベツ				7日						
メキャベツ										
非結球レタス										
				32				1.6~2ℓ/10a		
				150				4~5ℓ/10a		
				4,000				100~300ℓ/10a		
レ タ ス	40	1.6~2ℓ/10a								
	150	4~5ℓ/10a								
葉 ご ぼ う			14日	2回	2回	散 布				
ご ぼ う			7日							
ほうれんそう	アブラムシ類 アザミウマ類 ウリハムシモドキ	4,000	100~300 ℓ/10a				前日			
ふだんそう エンダイブ	アブラムシ類						7日			
た ま ね ぎ	アザミウマ類	200	セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパーポット1箱 (30×60cm、 使用土量 約1.5 ~4ℓ) 当90.5ℓ				定植前日 ~ 定植時	1回	2回(定植時までの 処理は1回)	灌 注
ね ぎ	アザミウマ類	2,000~4,000	100~300ℓ/10a				14日	2回	3回(定植時までの 処理は1回、 散布は2回)	散 布
	ネギハモグリバエ クロバネノコバエ類	200	セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパーポット1箱 (30×60cm、 使用土量 約1.5 ~4ℓ) 当90.5ℓ				定植前日 ~ 定植時	1回		灌 注

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用 液量	使用 時期	使用回数*		使用方法						
					本剤	イミダクロプリド							
わ け ぎ あ さ つ き も ろ へ い や く わ い れ ん こ ん	アザミウマ類	2,000~4,000	100~300 ℓ/10a	3日	2回	3回	散 布						
		2,000											
	せり科葉菜類 (コリアンダー(葉)、 セルリー、パセリ、 みつば、せりを除く)	アブラムシ類					4,000				無人航空機 による散布		
	コリアンダー(葉)												
	パ セ リ												
	セ ル リ ー												
	う ど						2,000						
き ゆ う り (施設栽培)	アブラムシ類 アザミウマ類	4,000	100~300 ℓ/10a	前日	3回	3回	散 布						
メ ロ ン													
か ぼ ち ゃ	アブラムシ類												
す い か													
ト マ ト ミニトマト	コナジラミ類 アブラムシ類												
ピーマン(施設栽培)	アブラムシ類												
な す	アブラムシ類 アザミウマ類												
オクラ(施設栽培)													
し そ	アブラムシ類												
しそ科葉菜類 (しそを除く)													
しそく(花穂)													
ふ き	アブラムシ類 コナジラミ類	2,000	100~200 ℓ/10a	前日	3回	3回	散 布						
ふき(ふきのとう)													
アスパラガス													
やなぎたで													
未成熟そらまめ													
未成熟ささげ (施設栽培)	アブラムシ類												
はまぼうふう(葉)													
ざんしょう(葉)													
食用プリムラ													
食用さくら(葉)	アザミウマ類												
食用かえて(葉)	アブラムシ類												
きく(葉)(施設栽培)	アザミウマ類	2,000	100~200 ℓ/10a	発生 初期 ※1	5回	5回	株元灌注						
食用きく(施設栽培)													
きく(施設栽培)													
花き類・観葉植物 (きくを除く)	アブラムシ類												
ポインセチア (施設栽培)	アブラムシ類 コナジラミ類												
つ つ じ 類	ツツジグンバイ												
か え で	モミジニタイケアブラムシ							5,000	1ℓ/㎡	発生前	2回	2回	散 布
デ イ ゴ	デイゴヒメコバチ							2,000	200~700 ℓ/10a	発生初期 ※1			

※1 ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く

※2 ただし、露地栽培については開花期終了後

※3 ただし、露地栽培については着果後

※印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と、本剤およびその有効成分を

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用 液量	使用 時期*	使用回数* 本剤	イミダクロプリド	使用方法
わ け ざ あ さ つ き	アザミウマ類	2,000~4,000		3日	2回	3回(定植時の土壌混 和は1回、散布は2回)	散 布
モ ロ ヘ イ ヤ		2,000		14日	1回	1回	
く わ い				21日	3回	3回	
れ ん こん				14日 ※2	2回	3回(植付時の土 壌混和は1回、植 付後の処理は2回)	
せり科葉菜類 (コリアンダー(葉)、 セルリー、パセリ、 みつば、せりを除く)	アブラムシ類	4,000		14日	1回	1回	
コリアンダー(葉)				3日	2回	2回	
パ セ リ				14日	1回	2回(定植時までの処 理は1回、散布は1回)	
セ ル リ ー				7日		3回	散 布
う ど		2,000		根株養成期 ただし、収穫 60日前まで			
き ゅ う り (施設栽培)	アブラムシ類 アザミウマ類			前日	3回	4回(育苗期の株元 散布および定植時 の土壌混和は合計 1回、散布および常 温燻蒸は合計3回)	
メ ロ ン				3日 ※3		4回(育苗期の株 元散布および定 植時の土壌混和 は合計1回、散布 は3回)	
か ぼ ち ゃ	アブラムシ類			前日 ※3	2回	3回(定植時の土 壌混和は1回、散 布は2回)	
す い か				3日 ※3	3回	4回(定植時の土 壌混和は1回、 散布は3回)	
ト マ ト ミニトマト	コナジラミ類 アブラムシ類	4,000	100~300 ℓ/10a	前日	2回	3回(育苗期の株元 散布および定植時 の土壌混和は合計 1回、散布は2回)	散 布
ピーマン(施設栽培)	アブラムシ類			前日	2回	3回(育苗期の株元散布 および定植時の土 壌混和は合計1回、 散布および常温燻 蒸は合計2回)	
な す	アブラムシ類 アザミウマ類			3日	3回	3回	
オクラ(施設栽培)				7日		2回	
し そ	アブラムシ類			45日		2回	
しそ科葉菜類 (しそを除く)				前日	3回	3回	
しそ(花穂)				7日		2回	
ふ き ふき(ふきのとう)	アブラムシ類 コナジラミ類			45日		2回	散 布
アスパラガス	アザミウマ類	2,000		前日	3回	3回	
やなぎたで				7日 ※2		3回(定植時およびは 種時の土壌混和は 合計1回)	
未成熟そらめ				前日	2回	3回(定植時およびは 種時の土壌混和は 合計1回、散布は2 回)	
未成熟さざげ (施設栽培)	アブラムシ類	4,000		7日		2回	
はまぼうふう(葉)				14日	3回	3回	
さんしょう(葉)				3日	2回	2回	
食用ブリンム	アザミウマ類			3日	1回	1回	散 布
食用さくら(葉)	アブラムシ類			14日	2回	2回	
食用かえて(葉)	アザミウマ類			7日	2回	2回	
きく(葉)(施設栽培)	アブラムシ類			発生 初期 ※1	5回	5回	
食用ざく(施設栽培)	アザミウマ類			発生 初期 ※1	5回	5回	
きく(施設栽培)	アブラムシ類			発生 初期 ※1	5回	5回	
花き類・観葉植物 (きくを除く)	アブラムシ類			発生 初期 ※1	5回	5回	
ポインセチア (施設栽培)	アブラムシ類 コナジラミ類	2,000	100~200 ℓ/10a	発生 初期 ※1	5回	5回	散 布
つ つ じ 類	ツツジゲンバイ	5,000	1ℓ/㎡	発生前	2回	2回	
か え で	モミジナイトケアブラムシ			発生前	2回	2回	散 布
デ イ ゴ	デイゴヒメコバチ	2,000	200~700 ℓ/10a	発生前	2回	2回	

※1 ただし、露地栽培については発芽期から開花期を除く ※2 ただし、露地栽培については開花期終了後
※3 ただし、露地栽培については着果後
*印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と、本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

バイエル クロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 <https://cropsience.bayer.jp/>

お客様相談室 ☎0120-575-078 9:00~12:00,13:00~17:00
土日祝日および会社休日を除く

F-1006 21.09.NY