

恵みには、
かかせないもの。



ロブラル® 500アクア

作物への汚れが少なく、使いやすい。
環境にもやさしい殺菌剤の決定版。



FMC

®はFMC Corporation or its subsidiariesの登録商標

ロブルール500アクアの特長

- 1 ▶ フロアブルタイプのため粉立ちがなく、薬液調製が簡単です。
- 2 ▶ 水和剤に比べ、作物への汚れを軽減することができます。
- 3 ▶ 各種作物の重要病害に対して優れた予防効果を示します。

適用病害および使用方法 (2016年7月現在の登録内容)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用時期*	使用回数*		使用方法
				本剤	イプロジオンを含む農薬の総使用回数	
きゅうり	菌核病、つる枯病、灰色かび病	1,000~1,500	前日	4回	5回 (種子粉衣1回、は種後4回)	散布
なす	灰色かび病					
いちご						
トマト		4回 (種子粉衣1回、は種後3回)				
おうとう	灰星病	1,500	14日	3回	3回	
りんご	斑点落葉病			5回	5回	
もも	灰星病	1,000~1,500	前日	3回	3回	
ハスカップ	灰色かび病			1回	1回	
ふさすぐり	果実腐敗症	1,000	3日	3回	3回	
いちじく	黒かび病					

*印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と、本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきって下さい。
- 使用に当っては容器をよく振って下さい。
- ボルドー液、石灰硫黄合剤との混用は避けて下さい。
- りんごに使用する場合、旭種には薬害を生じる恐れがありますので使用は避けて下さい。
- おうとうに使用する場合、着色期以降の散布は果実に汚れを生じる恐れがありますので留意して下さい。
- 蚕に対して影響がありますので、周辺の桑葉にはかからないようにして下さい。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用して下さい。
- 誤飲などのないように注意して下さい。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性がありますので、眼に入らないよう注意して下さい。眼に入った場合には直ちに水洗して下さい。
- 直射日光を避け、なるべく低温な場所に密栓して保管して下さい。
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収して下さい。
- 火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努めて下さい。
- 移送取扱いは、ていねいに行ってください。

● 使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ● ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

バイエル クロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 www.bayercropscience.co.jp

お客様相談室 ☎0120-575-078 9:00~12:00、13:00~17:00
土・日・祝日を除く

第1版 (F-2026 16.07.JWT)