

# 大切なトマトを コナジラミから 救ってクリア



## クリアザール® フロアブル



- ・バイオタイプQを含むコナジラミ類によく効きます。
- ・密度の低い時期に散布することでコナジラミの発生を長期間抑えることができます。
- ・マルハナバチの翌日放飼が可能なので施設栽培に最適です。
- ・各種天敵に対して影響の少ない薬剤です。



製品情報はこちら



## ■適用害虫および使用方法

2023年5月現在の登録内容


作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用回数*		使用方法
					本剤	スピロメシフェン	
トマト ミニトマト	コナジラミ類	2,000 ~ 4,000 倍	100 ~ 300 ℓ / 10a	収穫前日まで	2 回	2 回	散布
	トマトサビダニ	2,000 倍					

\*印は収穫物の残留回避のため、本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

## ■上手な使い方



本剤は成虫に対する効果はありませんが幼虫に高い効果を示します。  
遅効的な薬剤なので、コナジラミの発生初期に散布することで長期間の密度抑制効果が期待できます。

※栽培体系は地域によって異なります。ご使用の際は各地区の防除暦に従って下さい。



※コナジラミの成虫が散見され始めた頃(低密度の時期)が散布適期です。  
散布後しばらくたっても成虫が活着している場合がありますが、その後徐々に密度が低下し、長期間発生を抑えます。

## ■タバココナジラミに対する効果



## ■注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調整し、使い切ってください。
- 本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振って下さい。
- キャベツ、はくさい、こまつな、ねぎ、ばら、シンビジウム等のラン類、みょうがに対して薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合はかからないように注意して散布して下さい。
- 開花期の水稲に本剤がかかった場合、不稔等の薬害を生じる場合があるのでかからないように注意して下さい。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 誤飲などのないよう注意して下さい。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の指導を受けさせて下さい。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意して下さい。眼に入った場合には直ちに水洗して下さい。
- 散布の際は農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して下さい。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換して下さい。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯して下さい。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意して下さい。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないで下さい。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理して下さい。
- 直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管して下さい。

● 使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ● ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

バイエル クロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 <https://cropscience.bayer.jp/>

お客様相談室 ☎0120-575-078 9:00~12:00, 13:00~17:00  
土日祝日および会社休日を除く

F-1130 23.05.NY