

元気いっぱい Oh おいしい!



オルフィン® フロアブル

新登場

新規殺菌剤 **フルオピラム** 含有。
重要病害をしっかりと防除。
安心して、高品質な作物づくりを。



ハクサイ黒斑病



キャベツ菌核病



レタス灰色かび病



イチゴうどんこ病



タマネギ灰色腐敗病



インゲンマメ菌核病

オルフィンフロアブルの特長

新規殺菌剤フルオピラム配合

オルフィンフロアブルは、ピリジニルエチルベンズアミド系のコハク酸脱水素酵素阻害剤（SDHI）フルオピラムを有効成分とする新しい殺菌剤です。

優れた浸達性・浸透移行性

散布後、薬剤はワックス層に吸収され素早く組織内に浸透し処理面の反対側まで達します。浸透した薬剤は導管を通して上方移行し、植物体の広範囲に行き渡り、残効性にも寄与します。

幅広い殺菌スペクトラム

糸状菌類による多くの病害に効果を示します。特に *Botrytis* 属菌（灰色かび病など）、*Sclerotinia* 属菌（菌核病など）、うどんこ病菌に活性が高く、安定した防除効果を示します。

高い耐雨性

散布後速やかに葉の表面から葉内のワックス層に吸着し拡散します。

浸透移行性も高いことにより優れた耐雨性を示し、安定した効果が期待できます。

適用病害および使用方法（一部抜粋）

（2018年9月現在）

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	10アール当り 使用液量(ℓ)	使用時期*	使用回数*		使用方法
					本剤	フルオピラム	
はくさい	白斑病 黒斑病	2,000 ～ 3,000	100～300	7日	1回	1回	散布
キャベツ	菌核病						
レタス	菌核病						
リーフレタス	灰色かび病						
いちご	灰色かび病 うどんこ病	2,000	100～150	14日	3回以内	3回以内	
				前日			
豆類 (種実、ただし、 らっかせいを除く)	菌核病 灰色かび病	2,000	7日	前日	3回以内	3回以内	
たまねぎ	小菌核病 灰色かび病 灰色腐敗病	2,000 ～ 3,000	前日				

*印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と、本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

※その他適用作物にりんご、なし、もも、ネクタリン、小粒核果類、おうとう、ぶどうがあります。

注意事項

- 使用に際しては容器をよく振って下さい。
- 使用液量は、対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節して下さい。
- 調製した薬液は、調製した当日に使い切ってください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにして下さい。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用して下さい。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 誤飲などのないよう注意して下さい。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して下さい。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして下さい。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

バイエル クロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 <https://cropscience.bayer.jp>

お客様相談室 ☎0120-575-078 9:00～12:00, 13:00～17:00
土・日・祝日を除く

(F-2081 18.09.JWT)