



ヨーバル®
箱粒剤

はねかえせ!
初期害虫、
チョウ目害虫。



- 新規殺虫剤「ヨーバル®」
- 幅広い害虫に優れた効果
- は種前から移植当日まで使用可能

® ヨーバルはバイエルグループの登録商標



イネミスゾウムシ



イネドロオイムシ



ニカメイチュウ



フタオビコヤガ



イネツトムシ



コブノメイガ



農林水産省登録:第24328号
 有効成分:テトラニプロロール……1.5%
 性状:類白色細粒
 毒性:普通毒(毒劇物に該当しないものを指していう通称)

1 新規殺虫剤「ヨーバル®」。
 「ヨーバル®」(有効成分:テトラニプロロール)は、バイエル クロップサイエンス社により開発された、アントラニルアミド構造を有する新しいジアミド系殺虫剤です。

2 水稻主要害虫に優れた効果を発揮。
 初期害虫のイネミズゾウムシ、イネドロオイムシや、チョウ目害虫のニカメイチュウ、コブノメイガ、フタオビコヤガ等、水稻の主要害虫に高い効果を示します。

3 は種前、は種時から移植当日まで使用可能。
 覆土、床土混和、は種時覆土前から移植当日までの幅広い時期で処理が可能です。


適用害虫および使用方法

(2020年2月現在)

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	総使用回数*	使用方法
稲 (箱育苗)	イネツトムシ イネドロオイムシ イネヒメハモグリバエ イネミズゾウムシ コブノメイガ ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り50g	は種前	本剤:1回 テトラニプロロール:1回	育苗箱の床土 または覆土に 均一に混和する
			は種時(覆土前) ～移植当日		育苗箱の上から 均一に散布する

*印は収穫物への残留回避のため、本剤およびそれぞれの有効成分を含む農業の総使用回数の制限を示す。

試験成績



注意事項

- 本剤を床土または覆土に混和処理する場合、処理後速やかに使用して下さい。また本剤を処理した床土または覆土を放置しないで下さい。
- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗などには薬害を生じるおそれがあるので注意して下さい。
- 本田の整地が不均整な場合は、薬害を生じやすいので、代かきは丁寧に、移植後田面が露出しないように注意して下さい。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 誤食などのないよう注意して下さい。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けて下さい。
- 使用の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して下さい。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換して下さい。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯して下さい。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意して下さい。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意して下さい。
- 散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないで下さい。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理して下さい。
- 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管して下さい。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

バイエル クロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 <https://cropscience.bayer.jp/>

お客様相談室 ☎0120-575-078 9:00~12:00、13:00~17:00 土・日・祝日を除く

(F-1150 20.02.jeki)