

恵みには、
かかせないもの。



ロブルール® 水和剤

野菜類や果樹類など
多くの作物に登録がある。
環境にもやさしい殺菌剤の決定版。

農林水産省登録:第14212号

●成分:イプロジオン.....50.0%



作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期*	使用回数*		使用方法
					本剤	イプロジオンを含む農薬の総使用回数	
かんぎつ	灰色かび病	1,000~2,500	200~700ℓ/10a	7日	3回	3回	散布
	黄斑病	1,000~1,500					
	黒腐病	1,000					
りんご	斑点落葉病	1,000~1,500		14日	5回	5回	
	なし						
もも	灰星病	1,000		前日	3回	3回	
ネクタリン	ホモフシス腐敗病						
おうとう	灰星病	1,000~1,500		前日	4回	4回	
すもも	黒かび病	1,000					
あんず	灰星病	1,000~1,500		3日	2回	2回	
びわ	灰色かび病						
うめ	灰色かび病、環紋葉枯病	1,000	45日	前日	4回		
食用桑(果実)	菌核病						
キウイフルーツ	果実軟腐病	1,000~1,500	開花期~落花期	前日	4回	4回	
	灰色かび病	1,500~2,000					
	貯蔵病害(灰色かび病)						
ぶどう	灰色かび病、白腐病	1,000~1,500	開花期~幼果期但し、60日	3回	3回		
	黒どう病	1,000					
マンゴー	灰色かび病		60~150ℓ/10a	7日	3回	3回	
はとむぎ	葉枯病						
いちご	灰色かび病、黒斑病、菌核病	1,500	前日	4回	5回 (種子粉衣は1回、 は種後は4回)		
ピーマン	灰色かび病	1,000~1,500					
なす	菌核病	1,000	前日	1回	2回(種子粉衣は1回、 は種後は1回)		
	黒核病	1,000~1,500					
きゅうり	菌核病、つる枯病	1,000	14日	3回	4回以内 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)		
すいか	菌核病	1,000					
メロン	菌核病、つる枯病	1,000	7日	1回	2回(種子粉衣は1回、 は種後は1回)		
ズッキーニ	灰色かび病	1,000~1,500					
キャベツ	菌核病、株腐病	1,000	14日	3回	4回(種子粉衣は1回、 は種後は3回)		
薬用ニンジン	灰色かび病、斑点病	1,000~1,500					
にんじん	斑点病、黒葉枯病	種子重量の0.5%	-	は種前	1回	種子粉衣	
	黒葉枯病						
漬物用メロン	菌核病、つる枯病	1,000	14日	1回	2回(種子粉衣は1回、 は種後は1回)		
オクラ	黒斑病、灰色かび病	2,000					
トマト	灰色かび病	1,000~1,500	前日	3回	4回(種子粉衣は1回、 は種後は3回)		
ミニトマト	輪紋病、斑点病	1,000					
ごぼう	菌核病		1,000	3日	3回	4回(種子粉衣は1回、 は種後は3回)	
あしたば	葉枯病						
たまねぎ	灰色かび病、灰色腐敗病、黒斑病	1,000~1,500	7日	3回	4回以内 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)		
くさちしゃ	灰色かび病						
レタス	菌核病、すそ枯病	1,000~1,500	前日	3回	4回以内 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)		
	菌核病、すそ枯病	1,000					
バジル	菌核病	2,000	14日	3回	4回以内 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)		
はくさい	菌核病	1,000					
ねぎ	白班病、黒斑病	1,000~1,500	0.5~1ℓ/m ²	14日	1回	株元灌注	
	ポトリチス葉枯病、黒斑病、小菌核腐敗病	500					
	小菌核腐敗病	500~1,000					
あざつき	ポトリチス葉枯病、黒斑病、小菌核腐敗病	1,000~1,500	100~300ℓ/10a	30日	3回	散布	
わけぎ	灰色かび病						
らっきょう	菌核病	1,000	3ℓ/種いも100kg	前日	4回	種いも散布	
ばれいしょ	黒あざ病	125					
ざやえんどう	灰色かび病	1,500	前日	1回	4回以内 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)		
えだまめ	灰色かび病、菌核病	1,000					
未成熟そらまめ	赤色斑点病		1,000	30日	3回	4回以内 (種子粉衣は1回、 は種後は3回)	
実えんどう	灰色かび病						
だいず	灰色かび病、菌核病	1,000	21日	3回	3回		
あずき	灰色かび病	1,000~1,500					
いんげんまめ	菌核病	500~1,000	100~300ℓ/10a	7日	2回	3回 (種子粉衣は1回、 は種後は2回)	
らっかせい	灰色かび病	1,000~1,500					
てんさい	葉腐病	500~1,000	前日	1回	4回(種子粉衣は1回、 は種後は3回)		
食用ゆり	葉枯病	1,000					
ししとう	灰色かび病	2,000	3日	2回	3回 (種子粉衣は1回、 は種後は2回)		
とうからし類 (ししとうを除く)	灰色かび病	1,000					
葉たまねぎ	灰色かび病、灰色腐敗病、黒斑病	1,000	14日	2回	3回 (種子粉衣は1回、 は種後は2回)		
ひろしまな	白班病	1,500					
未成熟さざげ	灰色かび病		1,000	前日	1回	4回(種子粉衣は1回、 は種後は3回)	
葉ごぼう	灰色かび病						
のざわな	菌核病	1,000	30日	3回	4回(種子粉衣は1回、 は種後は3回)		
みぶな	菌核病						
みつば(軟化栽培)	菌核病	1,000	2ℓ/m ²	根株養成期 地上部切り取り前 但し、35日	4回(種子粉衣は1回、 散布は2回、土壌灌注は1回)	土壌灌注	
畑わさび	墨入病	500					
うど	黒斑病	1,000	100~300ℓ/10a	定植時	3回	定植時に20時間苗浸漬し、 更に定植後に灌注する。	
	菌核病	1,000					
アスパラガス	根腐病	1,000	6ℓ/m ²	根株養成期但し、50日	3回	4回(散布は3回、 土壌灌注は1回)	
	菌核病	1,000					
アスパラガス	茎枯病、斑点病	2,000	100~300ℓ/10a	前日	5回	6回(種子粉衣は1回、 は種後は5回)	散布
茶	灰色かび病	1,000~1,500	200~400ℓ/10a	21日	2回	2回	散布
スターチス	灰色かび病	1,000~1,500	100~300ℓ/10a	-	8回	8回(種子粉衣は1回)	
りんどう	苗腐敗症(アルタナリア菌)	250~500	-	は種前	1回	2回(種子粉衣は1回)	48時間種子浸漬
たばこ	菌核病	1,500~2,000	100~300ℓ/10a	本葉展開直後~定植前	2回	2回(種子粉衣は1回)	散布
芝	菌核病	1,500~2,000	200ml/株	大土寄せ時	1回	1回	株元灌注
日本芝	葉腐病(ブラウンパッチ)、 ヘルミントスポリウム葉枯病	1,000~1,500	1ℓ/m ²	発病初期	8回	8回	散布
西洋芝(ペントラス)	葉腐病(ラージパッチ)	1,000~1,500	1ℓ/m ²	発病初期	8回	8回	散布
野草類、花き類	タラスポット病						
野菜類、花き類	アルタナリア菌による病害	種子重量の0.5%	-	は種前	1回	1回	種子処理機による種子粉衣

適用場所	作物名	適用病害虫名	10アール当り使用量		使用時期	使用回数		使用方法
			薬量(g)	使用液量(ℓ)		本剤	イプロジオンを含む農薬の総使用回数	
温室、ガラス室、 ビニールハウス等の 密閉できる場所	きゅうり	灰色かび病	200	5	前日	4回	5回(種子粉衣は1回、 は種後は4回)	常温煙霧
	トマト、ミニトマト			6		3回	4回(種子粉衣は1回、 は種後は3回)	
	ぶどう				開花期~幼果期、但し、60日		3回	

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

バイエル クロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 www.bayercropscience.co.jp

お客様相談室 ☎0120-575-078 9:00~12:00, 13:00~17:00
土・日・祝日を除く