



キラップ® 粉剤DL

うまい汁は吸わせない！



アカヒゲホソミドリカスミカメ



オオトゲシラホシカメムシ



ミナミアオカメムシ



アカスジカスミカメ



イネドロオイムシ




コバネイナゴ



農林水産省登録第21470号

- 斑点米カメムシに高い殺虫効果を発揮します。
- カメムシ防除で米の等級を下げる斑点米の発生を抑制します。
- イナゴ類・イネドロオイムシにも高い効果を発揮します。

®はバイエルグループの登録商標



特長

- 最近問題となっているアカヒゲホソミドリカスミカメ、アカスジカスミカメなどカメムシ類に対して優れた効果を示します。また、イナゴ類・イネドロオイムシにも高い活性を示します。
- 従来の散布剤とは作用性が異なりますので、他剤に感受性の低下した害虫にも効果が期待できます。

適用害虫および使用方法



(2018年6月現在の登録)

作物名 []は適用場所	適用害虫名	10アール当り 使用量(kg)	使用時期*	使用回数*	使用方法
稲	ウンカ類 カメムシ類 イネドロオイムシ イナゴ類	3～4	14日	2回 (は種時(直播) または 移植時までの 処理は1回)	散布
だいち	カメムシ類	3	7日	2回	
水田作物 畑作物(休耕田) 〔ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ 等の多年生雑草が優占している休耕田〕		4	—		

*印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と、本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

上手な使い方

- アカヒゲホソミドリカスミカメに対しては、出穂の7～10日後及びその7～10日後が散布時期です。(各地で推奨されている散布時期に従ってご使用ください。)



注意事項

- 本剤はできるだけ飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散布機の開度を1目盛程度しぼって散布して下さい。
- 蚕に対して影響がありますので、周辺の桑葉にはかからないようにして下さい。桑にかかった場合には7日以上経過してから給桑して下さい。
- ミツバチに対して影響がありますので、以下のことに注意して下さい。
 - ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにして下さい。
 - 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めて下さい。
- 空袋は圃場などに放置せず適切に処理して下さい。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性がありますので眼に入らないよう注意して下さい。眼に入った場合には直ちに水洗して下さい。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して下さい。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして下さい。
- 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管して下さい。

● 使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ● ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

バイエル クロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 <https://cropscience.bayer.jp/>

お客様相談室 ☎0120-575-078 9:00～12:00、13:00～17:00
土・日・祝日を除く

(F-1086 18.06.IS)