

確かな収穫へと導く 2つの力



ルーチン[®] デュオ 箱粒剤

- は種前から移植当日まで、箱でいつでも使えて、本田で長く効く、安心の2成分
- いもち病防除の新定番「ルーチン」と初期害虫およびチョウ目害虫に優れた効果を示す**新規殺虫剤「シアントラニリプロール」**を配合

新登場




いもち病



イネミスソウムシ



イネドロオイムシ



フタオビコヤガ



いもち病防除の**新**定番

箱でいつでも使えて、本田で長く効く、安心の2成分。

ルーチン® デュオ 箱粒剤

農林水産省登録 第23571号

●成分：シアントラニプロロール………0.75%
イソチアニル………2.0%

●毒性：普通物 (『毒物および劇物取締法』にもとづく毒物・劇物に該当しないものを指す) という通称

ルーチンデュオ箱粒剤の特長

- **いもち病と水稻害虫に優れた効果** …… 水稻で問題となる主要な病害虫を幅広く防除します。
- **幅広い使用時期** …… 播種前から移植当日までの間、いつでも使用可能です。
- **イネに対する安全性が高い** …… 薬害が生じるリスクが低いことが確認されています。

適用病害虫および使用方法 (2018年10月現在)


作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	使用回数*	使用方法
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 イネミズゾウムシ イネドロオウムシ フタオビコヤガ ニカメイチュウ ツマグロヨコバイ イネツトムシ コブノメイガ イナゴ類 穂枯れ(ごま葉枯菌) 内穎褐変病 イネヒメハモグリバエ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り50g	は種前	本剤:1回	育苗箱の床土または 覆土に均一に混和する。
			は種時(覆土前) ~ 移植当日		
	は種前		イソチアニル:3回 (移植時までの処理は1回、 本田では2回)	育苗箱の床土または 覆土に均一に混和する。	
	は種時(覆土前) ~ 移植3日前~移植当日			育苗箱の上から 均一に散布する。	
苗腐敗症 (もみ枯細菌病) 苗立枯細菌病	は種前				
ヒメトビウンカ	は種時(覆土前) ~ 移植3日前~移植当日				

*印は収穫物への残留回避のため、本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

試験成績

●いもち病に対する効果

2013年 秋田県農業試験場




品 種: ナツノリ 発生状況: 葉) 中発生(接種)、種) 多発生
は 種: 4月10日 調査日: 葉) 7月26日(移植72日後)、種) 9月12日(移植120日後)
移 植: 5月15日 薬剤処理量: 50g/箱

品 種: ナツノリ 発生状況: 葉) 中発生(接種)、種) 多発生
は 種: 4月10日 調査日: 葉) 7月25日(移植70日後)、種) 9月11日(移植118日後)
移 植: 5月16日 薬剤処理量: 50g/箱

●イネドロオウムシに対する効果

2013年 日植防千葉



品 種: コシヒカリ 発生状況: 多発生(幼虫の繭数)
は 種: 4月15日 調査日: 6月10日(播種31日後)
移 植: 5月10日 薬剤処理量: 50g/箱

注意事項

- 本剤を床土または覆土に混和する場合、処理後速やかに使用して下さい。また、本剤を処理した床土または覆土を放置しないで下さい。
- 育苗箱の上から均一に散布し、葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水して田植機にかけて移植して下さい。
- ヒメトビウンカに対しては残効性に注意して下さい。
- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗等には薬害を生じるおそれがありますので注意して下さい。
- 本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきをはいていぬいに行い、移植後田面が露出しないように注意して下さい。
- いぐさ栽培予定水田では使用しないで下さい。また、本剤を処理した稲苗を移植した水田ではいぐさを栽培しないで下さい。
- きく等の他作物に影響を及ぼす場合がありますので、薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように散布して下さい。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 誤食などのないよう注意して下さい。
- かぶれやすい体質の人は取扱に十分注意して下さい。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意して下さい。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないで下さい。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理して下さい。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

バイエル クロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 <https://cropscience.bayer.jp>

お客様相談室 ☎0120-575-078 9:00~12:00、13:00~17:00
土・日・祝日を除く

(F-2106 18.10.JWT)