



ボデーガード[®]プロ

ジャンボ

2成分で稲を守る。プロ。
高葉齡ノビエも難防除雑草も、的確に防除。



新登場



一発でノビエ、
難防除雑草をしっかり除草。
鉄コーティング直播栽培にも対応。
次世代の水稲用除草剤
「ボデーガードプロ」は
多角化・大規模化に貢献します。



幅広い殺草スペクトラムで、ノビエ、SU抵抗性雑草(コナギ、ホタルイ、アゼナ類など)、
問題雑草(クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ)に有効です。





ポデーガードプロの特長

■ 2成分で高い除草効果

テフリルトリオンと新規成分トリアファモンの2種混合の初・中期一発処理除草剤で、幅広い草種に対して高い除草効果を示します。

■ ノビエへの優れた効果

高葉齢のノビエに対する枯殺力が高く、また、長期残効性を有します。

■ 問題雑草への高い効果

クログワイ、オモダカ、コウキヤガラに高い除草効果・塊茎形成抑制効果を示します。効果持続性が長く、通常の圃場条件では1回の散布で雑草を防除することができます。

■ 特殊雑草にも有効

アシカキ、エゾノサヤヌカグサ、キシウスズメノヒエ等の多年生イネ科雑草やクサネム、イボクサ等の特殊雑草にも有効です。

■ 水稲に対する安全性が高い

水稲に対して優れた選択性を有し、通常の圃場条件下で安心して使用できます。

■ 直播水稲に適した薬剤性能

直播水稲(鉄コーティング直播栽培含む)において、本剤は効果・安全性ともに優れ、1キロ粒剤はは種時からノビエ3.5葉期まで、フロアブルは稲1葉期からノビエ3.5葉期まで、ジャンボが稲1葉期からノビエ3葉期までの幅広い散布時期で余裕をもって使用できます。

適用雑草と使用方法

(2017年1月現在の登録内容)

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り 使用量	使用回数*	使用方法
移植 水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ コウキヤガラ	移植後5日～ノビエ 3葉期 ただし、 移植後30日まで	小包装 (バック) 10個 (300g)	本剤 1回 テフリルトリオン 2回 トリアファモン 2回	水田に 小包装(バック)のまま 投げ入れる
直播 水稲	水田一年草雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ノビエ 3葉期 ただし、 収穫90日前まで			

*印は収穫物への残留回避のため、本剤およびそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

注意事項

■必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきって下さい。

■本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに、時期を失しないように散布して下さい。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布するようにして下さい。ホタルイは3葉期まで、ヘラオモダカ、ミズガヤツリは4葉期まで(直播水稲のミズガヤツリでは3葉期まで)、ウリカワは3葉期まで(直播水稲では2葉期まで)、クログワイは発生始期まで、オモダカは発生前から広線形葉2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで、コウキヤガラは発生始から草丈25cmまでが本剤の散布適期です。クログワイ、オモダカは発生期間が長く、遅い発生のもものでは、十分な効果を示さないで、必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせ使用して下さい。

■散布の際は、水の出入りを止めて湛水状態(水深5～6cm)で散布して下さい。極端な浅水や深水での使用はさけて下さい。本剤は小包装(バック)のまま10アール当たり10個の割合で水田に均等に投げ入れて下さい。

■散布後3～4日間はそのまま湛水を保ち、田面を露出させないようにし、散布後7日間は落水、かけ流しはしないで下さい。また、入水は静かに行ってください。

■浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平化及び植付作業はていねいに行ってください。未熟有機物を使用した場合は、特にていねいに行ってください。

■以下の条件では薬害を生じるおそれがあるので使用をさけて下さい。

- ①砂質土壌の水田及び漏水田(減水深2cm/日以上)
- ②軟弱苗を移植した水田
- ③極端な浅植えの水田及び浮き苗の多い水田

■稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので使用しないで下さい。

■藻や浮草が多発している水田では、拡散が不十分となり、効果の劣る可能性があるため使用をさけて下さい。

■著しい多雨条件では除草効果が低下する場合がありますので使用はさけて下さい。

■散布田の田面水を他の作物に灌水しないで下さい。

■薬害を生じるおそれがあるので、後作物としてなす、たまねぎ及びさやえんどうを栽培しないで下さい。

■本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これら作物の生育期に隣接田で使用する場合には十分に注意して下さい。

■本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用して下さい。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

ごくまれに水稲に白化症状が認められる場合があります。しかしながら、その後は正常な葉が伸展してくるので、生育に影響を及ぼすことはほとんどありません。

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。



JAグループ
農 協 | 全 農 | 経 済 連

全農は登録商標 第4702318号

バイエル クロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 www.bayercropscience.co.jp

お客様相談室 ☎0120-575-078 9:00～12:00、13:00～17:00
土・日・祝日を除く

(F-3243 17.01.IS)