



ポッシブル®

2成分で
白く枯らす。
効きめが見える。



バイエル クロップサイエンス株式会社
東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262
<https://cropscience.bayer.jp/>

お客様相談室 ☎0120-575-078
(9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。 ●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。



水稲用一発処理除草剤

ポッシブル[®] ジャンボ

有効成分の含有量および安全性

農林水産省登録：第22615号

種類名：テフリルトリオン・メフェナセット粒剤

含有量：テフリルトリオン …… 6.0%

メフェナセット …… 20.0%

試験名：BCH-063 ジャンボ

製剤の安全性

●

経口(ラット♀) LD₅₀ > 2,000mg/kg

経皮(ラット♀) LD₅₀ > 2,000mg/kg


●魚毒性：コイ LC₅₀(96h) 986mg/L

オオミジンコ EC₅₀(48h) 316mg/L

適用雑草と使用方法

注意事項

除草効果と水稲に対する安全性



拡散性



ポッシブルジャンボは散布後、約5秒で崩壊が始まり、速やかに田面水表面を拡散していきました。本剤の崩壊・拡散性は極めて良好で、約1分30秒後には拡散が完全に終了しました。



・試験場所：バイエルクロップサイエンス(株) 結城中央研究所 ・試験規模：20m×15m(300m²) ・散布時の水深：5cm ・散布方法：手散布

上手な使い方

使用時期は、ノビエ2.5葉期まで、ただし、移植後30日までです。一発処理の目安を日数で示しました。ノビエ発生状況を確認して散布してください。散布に際しては水の出入りを止め、十分な湛水状態(水深5～6cm)を保ち、田面の露出がないようにしてください。



※バックは水溶性のフィルム(WSB)です。ぬれた手で扱わないでください。※バックは破らずにそのまま投げ込んでください。